

农业与气象服务快报

2026 年第 17 期

湖北省气候中心

湖北省农业技术推广总站

2026 年 8 月 17 日

**上周全省高温大幅缓解，鄂北台风降水具有极端性
本周以多云为主，局地有垱子雨，需避雨做好病虫害防治**

一、上周作物生长发育状况

上周（2026 年 8 月 10—16 日，下同）我省再生稻为灌浆到收割期，中稻为孕穗至抽穗期，夏玉米为大喇叭口至抽雄期，棉花为花铃期，双季晚稻为分蘖期。

二、上周农业气象条件分析

上周前期（10 日—13 日白天），台风“白海豚”残涡给我省带来重大风雨影响，襄阳、十堰东部、随州等地出现暴雨到大暴雨、局地特大暴雨，谷城、保康国家站日雨量突破本地历史极值，周累计雨量襄阳大部、十堰东部、神农架及随州 100 毫米以上，其中襄阳、谷城、老河口一带 300 ~ 355.4 毫米；恩施地区、五峰、郧西及通城降水不足 10 毫米；其他地区降水 10 ~ 90 毫米（图 1）；全省大范围 7 到 9 级大风、局地 10 级。13 日晚至 16 日，全省转为多云或阵雨天气。

受台风带来的风雨天气影响，全省高温大幅缓解，中西部大部日最高气温 72 小时降幅超过 4℃（图 2），襄阳、随

州、荆门等地出现凉爽天气。

受襄阳、十堰东部、随州等地暴雨到大暴雨、局地特大暴雨，鄂北岗地出现旱涝急转，部分农田发生渍涝（图3），农作物受淹（图4~7）。此外，伴随的大风导致部分玉米出现倒伏（图8~9），水稻主产区稻飞虱等“两迁”害虫虫量明显增多（图10~11）。




图 1 湖北省 2026 年 8 月 10—16 日累计降水量 (毫米)




图2 湖北省2026年8月11—13日日最高气温72小时降幅(℃)




图3 湖北省2026年8月9日(左)、8月13日(右)
20cm 土壤相对湿度监测对比(%)



图4 8月12日谷城蔬菜地受淹

图5 8月12日谷城稻田受淹

	
图 6 8 月 12 日谷城玉米受淹	图 7 8 月 12 日老河口稻田受淹
	
图 8 8 月 12 日保康玉米倒伏	图 9 8 月 12 日保康玉米倒伏
	
图 10 8 月 14 日武汉稻田稻飞虱	图 11 8 月 14 日武汉稻田纹枯病

三、本周天气趋势及农业生产建议

预计本周（8 月 17—23 日）我省以多云、阵雨或雷阵雨为主，其中 19 日至 21 日十堰、襄阳、宜昌、咸宁等局地有“坨子雨”；22 日至 23 日受南海低压外围云系影响，鄂东南和鄂西可能有局地暴雨。大部分地区最高气温 32~36℃、

局地 38℃ 以上。具体预报如下：

8 月 17 日 08 时-18 日 08 时，全省多云到晴天，午后鄂西北、鄂西南、鄂东北东部、鄂东南局地有阵雨或雷阵雨。最高气温 32~36℃，最低气温 22~27℃，偏北风 2 到 3 级，阵风 4 到 5 级。

8 月 18 日 08 时-19 日 08 时，全省多云到晴天，午后局地有阵雨或雷阵雨。最高气温 32~36℃，最低气温 23~27℃，偏北风 2 到 3 级、阵风 4 到 5 级。

8 月 19 日 08 时-20 日 08 时，全省多云有分散性阵雨或雷阵雨，其中十堰、宜昌、咸宁局地大雨或暴雨。最高气温鄂西北 29~32℃、其他地区 32~36℃，最低气温西部 23~25℃、中东部 25~28℃，偏北风 2 到 3 级、阵风 4 到 5 级。

本周天气总体有利于灾后田间管理，但 19 日至 21 日局地有“坨子雨”，22 日至 24 日鄂东南和鄂西可能有局地暴雨，可能影响稻飞虱等病虫害防治成效。18 日至 22 日东部高温再度发展，对中稻、夏玉米授粉、灌浆略有不利影响。农业生产建议如下：

一是抢抓农时，加快推进收获作业。统筹调度收割、烘干、仓储等各类主体，引导新型主体和广大农户对成熟适宜的再生稻头季和春玉米进行即收即烘即储。再生稻头季收割留茬高度控制在 40 厘米以上，尽量在 8 月 20 日左右完成收获，为再生芽萌发和后续生长留足时间。春玉米根据含水量情况合理选用机械摘穗或直接机械脱粒收获方式。

二是因田施策，抓实田间精细管理。再生稻头季收割后

3-4 天复水，先灌“跑马水”润田，次日保持 2-3 厘米浅水层，以利透气护芽；同步追施 10-12 公斤复合肥作提苗肥，促进再生芽早发快长。双季晚稻根据苗情逐步开始排水晒田，长势偏弱田块增施 3-5 公斤尿素促进分蘖。棉花因地制宜喷施生长调节剂与叶面肥的混合液，优化株型结构，促进棉铃生长发育。

三是突出重点，科学防治病虫害为害。水稻重点监测稻飞虱、稻纵卷叶螟等迁飞性害虫的发生动态，当稻飞虱百丛虫量达到 1000 头以上、穗期百丛虫量达到 1500 头以上时，务必列为重点田块，立即启动达标防治。夏玉米重点抓好玉米螟、草地贪夜蛾等迁飞性害虫的监测，抓住低龄幼虫期开展防治。夏大豆关注豆荚螟、点蜂缘蝽等钻蛀性、刺吸性害虫发生情况，避免造成落花落荚。棉花加强盲蝽蟥、棉叶蝉、甜菜夜蛾的巡查，保护蕾铃，减少落桃。

制作：温泉沛、蔡鑫

审核、签发：刘凯文、曹鹏

报送单位：省农业农村厅，中国气象局减灾司、国家气象中心、国家气候中心，省局领导、减灾处、预报处、观测处

抄 送：省局各直属单位，省植保总站

发 送：各地市州气象局、农技推广（促进）中心