

附件

初审通过的品种简介

水稻

1. 黍两优 818（区试代号：黍两优 818）

申请者：湖北吾谷丰粮农业科技有限公司

育种者：湖北吾谷丰粮农业科技有限公司

品种来源：黍836S×R1018

品质产量：2024-2025年参加湖北省迟熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验测试中心（武汉）测定，出糙率80.1%，整精米率67.5%，垩白粒率20%，垩白度4.1%，直链淀粉含量15.4%，胶稠度60毫米，碱消值5.5级，透明度2级，长宽比3.1，达到农业行业标准《食用稻品种品质》三级。两年区域试验平均亩产647.8公斤，比对照丰两优四号增产3.3%。其中：2024年亩产619.8公斤，比丰两优四号增产0.9%；2025年亩产675.7公斤，比丰两优四号增产5.6%。2025年生产试验平均亩产677.6公斤，比对照丰两优四号增产5.5%。

特征特性：属中熟偏迟粳型两系杂交中稻品种。株高、株型适中，分蘖力强，生长势旺。叶色绿，剑叶长宽适中、直立。大穗型，谷粒长形，稃尖无色，无芒。后期熟相好。区域试验中株高116.4厘米，亩有效穗16.5万，穗长25.4厘米，每穗总粒数214.3粒，每穗实粒数186.7粒，结实率87.1%，千粒重24.13克，全生育期129.3天，比对照丰两优四号短2.6天。病害鉴定为稻瘟病综合指数3.8，稻瘟损失率最高级5级，中感稻瘟病；白叶枯病5级，中感白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病。耐热性3级，耐冷性7级。

栽培要点：1.适时播种，培育壮秧。4月中旬至5月上旬播种，大田一般亩用种量1.0-1.5公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。2.适时移栽，插足基本苗。秧龄30天以内，株行距16.7厘米×26.7厘米，每穴插2粒谷苗，亩插基本苗8-10万。3.科学管理肥水。重施底肥，早施分蘖肥，中后期增施钾肥和硅肥，一般亩施纯氮11-12公斤，氮磷钾比例为1:0.5:1。浅水插秧，寸水返青，薄水分蘖，够苗晒田，孕穗至抽穗扬花期保持深水层，后期干湿交替，直至黄熟。4.病虫害防治。苗期注意防治稻蓟马，大田注意防治纹枯病、稻瘟病、白叶枯病、稻曲病和螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外稻瘟病轻发区作中稻种植。

2. 荆两优 961（区试代号：荆两优 961）

申请者：湖北农发种业集团有限公司、湖北荆楚种业科技有限公司、湖北荆楚水

稻产业技术研究院有限公司

育种者：湖北农发种业集团有限公司、湖北荆楚种业科技有限公司、湖北荆楚水稻产业技术研究院有限公司

品种来源：荆9-1S×R61

品质产量：2024-2025年参加湖北省迟熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验检测中心(武汉)测定，出糙率79.2%，整精米率67.5%，垩白粒率22%，垩白度4.2%，直链淀粉含量15.5%，胶稠度74毫米，碱消值3.4级，透明度1级，长宽比3.3。两年区域试验平均亩产665.9公斤，比对照丰两优四号增产5.2%。其中：2024年亩产654.7公斤，比丰两优四号增产4.5%；2025年亩产677.0公斤，比丰两优四号增产5.8%。2025年生产试验平均亩产692.3公斤，比对照丰两优四号增产6.7%。

特征特性：属迟熟籼型两系杂交中稻品种。株型紧凑，分蘖力强，生长势中等。叶色浓绿，剑叶长、直立。大穗型，谷粒长形，稃尖无色，有短顶芒。后期熟相好。区域试验中株高128.2厘米，亩有效穗17.5万，穗长26.9厘米，每穗总粒数217.0粒，每穗实粒数173.3粒，结实率79.9%，千粒重23.56克，全生育期137.6天，比对照丰两优四号长6.2天。病害鉴定为稻瘟病综合指数2.8，稻瘟损失率最高级3级，中抗稻瘟病；白叶枯病5级，中感白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病；稻曲病7级，感稻曲病。耐热性3级，耐冷性5级。

栽培要点：1.适时播种，培育壮秧。4月中旬至5月下旬播种，大田一般亩用种量1.0-1.5公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。2.适时移栽，合理密植。秧龄30天以内，株行距13.3厘米×26.7厘米，每穴插2粒谷苗，亩插基本苗8万左右。3.科学管理肥水。施足底肥，早施追肥，巧施穗肥，一般亩施纯氮12公斤，氮磷钾比例为1:0.5:1。浅水返青，薄水分蘖，够苗晒田，孕穗至抽穗扬花期保持深水层，后期干干湿湿，直至黄熟。4.病虫害防治。重点防治稻曲病，注意防治白叶枯病、纹枯病、稻瘟病和稻蓟马、螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植。

3.铁两优 6135（区试代号：铁两优 6135）

申请者：湖北铁诚兴种业科技有限公司

育种者：湖北铁诚兴种业科技有限公司、安徽省农业科学院水稻研究所

品种来源：6102S×R135

品质产量：2024-2025年参加湖北省迟熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验检测中心(武汉)测定，出糙率79.6%，整精米率68.5%，垩白粒率25%，垩白度4.7%，直链淀粉含量15.2%，胶稠度63毫米，碱消值3.8级，透明度2级，长宽比3.1。两年区域试验平均亩产644.1公斤，比对照丰两优四号增产3.1%。其中：2024

年亩产630.7公斤，比丰两优四号增产3.6%；2025年亩产657.4公斤，比丰两优四号增产2.7%。2025年生产试验平均亩产公661.7斤，比对照丰两优四号增产7.1%。

特征特性：属迟熟籼型两系杂交中稻品种。株型偏紧凑，分蘖力强，生长势较旺。叶色绿，剑叶长、直立。穗层整齐，大穗型，谷粒长形，稃尖紫色，无芒。后期熟相比较好。区域试验中株高130.0厘米，亩有效穗18.2万，穗长26.2厘米，每穗总粒数208.4粒，每穗实粒数169.0粒，结实率81.1%，千粒重23.60克，全生育期134.6天，比对照丰两优四号长4.2天。病害鉴定为稻瘟病综合指数2.3，稻瘟损失率最高级3级，中抗稻瘟病；白叶枯病5级，中感白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病。耐热性3级，耐冷性5级。

栽培要点：1.适时播种，培育壮秧。4月下旬至5月上旬播种，大田一般亩用种量1.0-1.5公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。2.适时移栽，合理密植。秧龄30天左右，株行距16.7厘米×26.7厘米，每穴插2粒谷苗，亩插基本苗6万以上。3.科学管理肥水。施肥以基肥为主，追肥为辅，早施分蘖肥，一般亩施纯氮12-14公斤，氮磷钾比例为1:0.5:0.8。浅水插秧，寸水活蔸返青，薄水促蘖，插秧后20-25天时视苗情逐步晒田控苗，晒田应多次轻晒，孕穗至抽穗扬花期保持深水层，后期干干湿湿，直至黄熟。4.病虫害防治。苗期注意防治稻蓟马，大田重点防治稻曲病，注意防治纹枯病、白叶枯病、稻瘟病和螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植。

4.两优 1308（区试代号：汇 108S/HD308）

申请者：湖北省农业科学院粮食作物研究所

育种者：湖北省农业科学院粮食作物研究所、湖北汇楚智生物科技有限公司、襄阳市农业科学院

品种来源：汇108S×HD308

品质产量：2024-2025年参加湖北省迟熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验检测中心（武汉）测定，出糙率79.1%，整精米率64.1%，垩白粒率33%，垩白度6.6%，直链淀粉含量15.1%，胶稠度68毫米，碱消值4.0级，透明度2级，长宽比3.3。两年区域试验平均亩产669.7公斤，比对照丰两优四号增产6.8%。其中：2024年亩产653.7公斤，比丰两优四号增产6.4%；2025年亩产685.6公斤，比丰两优四号增产7.1%。2025年生产试验平均亩产659.0公斤，比对照丰两优四号增产5.2%。

特征特性：属中熟偏迟籼型两系杂交中稻品种。株型紧凑，分蘖力强，生长势旺。叶色浓绿，剑叶中长、微内卷、挺。大穗型，谷粒长形，稃尖紫色，无芒。后期熟相好。区域试验中株高125.2厘米，亩有效穗17.0万，穗长26.2厘米，每穗总粒数188.8粒，每穗实粒数162.6粒，结实率86.1%，千粒重27.99克，全生育期132.5天，比对照丰两优四号长0.6天。病害鉴定为稻瘟病综合指数2.3，稻瘟损失率最高级1级，抗稻瘟病；白

叶枯病5级，中感白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病；稻曲病7级，感稻曲病。耐热性1级，耐冷性3级。

栽培要点：1.适时播种，培育壮秧。鄂北5月5日左右播种，江汉平原、鄂东5月15-20日播种，大田一般亩用种量1.0-2.0公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗2叶1心期和移栽前5-7天各亩施尿素5公斤。2.适时移栽，插足基本苗。秧龄20-25天，株行距16.7厘米×26.7厘米，每穴插2-3粒谷苗，亩插基本苗8万左右。3.科学管理肥水。施肥以基肥为主，追肥为辅，一般亩施纯氮12公斤，氮磷钾比例为1:0.5:0.8。浅水插秧，寸水活蔸返青，薄水促蘖，插秧后20-25天时视苗情逐步晒田控苗，晒田应多次轻晒防倒伏，孕穗至抽穗扬花期保持浅水层，齐穗后灌足水，后期干干湿湿，直到黄熟。4.病虫害防治。苗期注意防治稻蓟马，大田重点防治稻曲病，注意防治纹枯病、白叶枯病、稻瘟病和螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植。

5.糯两优 55（区试代号：华粳糯 6 号）

申请者：湖北大楚农业科技有限公司、湖北华之诺农业科技有限公司

育种者：湖北大楚农业科技有限公司、湖北华之诺农业科技有限公司

品种来源：KF06S×R55

品质产量：2024-2025年参加湖北省中糯组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验检测中心（武汉）测定，出糙率77.2%，整精米率53.1%，阴糯米率0%，直链淀粉含量1.8%，胶稠度100毫米，碱消值5.0级，白度1级，长宽比3.0，达到农业行业标准《食用稻品种品质》三级。两年区域试验平均亩产591.1公斤，比对照扬辐糯4号增产8.8%。其中：2024年亩产575.6公斤，比扬辐糯4号增产5.8%；2025年亩产606.6公斤，比扬辐糯4号增产11.9%。2025年生产试验平均亩产636.6公斤，比对照扬辐糯4号增产8.6%。

特征特性：属中熟偏迟两系杂交中粳糯品种。株型适中，植株较高，分蘖力较强，生长势旺。叶色绿，剑叶宽长、较披。穗层较整齐，谷粒长形，稃尖紫色，有少量短顶芒。后期熟相好。区域试验中株高139.2厘米，亩有效穗16.9万，穗长24.7厘米，每穗总粒数174.0粒，每穗实粒数146.0粒，结实率83.9%，千粒重27.23克，全生育期133.4天，比对照扬辐糯4号长2.2天。病害鉴定为稻瘟病综合指数4.1，稻瘟损失率最高级5级，中感稻瘟病；白叶枯病5级，中感白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病；稻曲病7级，感稻曲病。耐热性3级，耐冷性5级。

栽培要点：1.适时播种，培育壮秧。4月中旬至5月上旬播种，大田一般亩用种量1.0-1.5公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。2.适时移栽，合理密植。秧龄30天左右，株行距16.7厘米×26.7厘米，每穴插2-3粒谷苗，亩插基本苗10万左右。3.科学管理肥水。重

施底肥，早施分蘖肥，巧施穗肥，中后期增施钾肥，一般亩施纯氮12-13公斤，氮磷钾比例为1:0.5:0.9。浅水插秧，寸水返青，薄水分蘖，够苗及时晒苗，深水孕穗，后期干湿交替，切忌断水过早。4.病虫害防治。苗期注意防治稻蓟马和矮缩病，大田重点防治稻曲病，注意防治纹枯病、稻瘟病、白叶枯病和螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植。

6.皓糯两优 3412（区试代号：皓糯两优 3412）

申请者：湖北中磐高科种业有限公司

育种者：湖北中磐高科种业有限公司、袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院有限公司、四川隆鼎金穗农业有限公司

品种来源：皓糯268S×华糯3412

品质产量：2023-2024年参加湖北省中糯组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验检测中心（武汉）测定，出糙率79.9%，整精米率66.2%，阴糯米率3%，直链淀粉含量1.7%，胶稠度100毫米，碱消值3.7级，白度1级，长宽比2.6。两年区域试验平均亩产621.5公斤，比对照扬辐糯4号增产15.0%。其中：2023年亩产618.9公斤，比扬辐糯4号增产15.2%；2024年亩产624.1公斤，比扬辐糯4号增产14.7%。2024年生产试验平均亩产645.3公斤，比对照扬辐糯4号增产9.0%。

特征特性：属中熟偏迟两系杂交中粳糯品种。株型适中，植株较高，分蘖力强，生长势旺。叶色绿，剑叶长、宽、半直立。穗层整齐，谷粒椭圆形，稃尖无色，无芒。后期熟相好。区域试验中株高133.2厘米，亩有效穗18.3万，穗长23.9厘米，每穗总粒数193.4粒，每穗实粒数162.5粒，结实率84.0%，千粒重24.05克，全生育期131.9天，比对照扬辐糯4号长0.8天。病害鉴定为稻瘟病综合指数3.3，稻瘟损失率最高级3级，中抗稻瘟病；白叶枯病7级，感白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病；稻曲病5级，中感稻曲病。耐热性3级，耐冷性1级。

栽培要点：1.适时播种，培育壮秧。4月下旬至5月上旬播种，大田一般亩用种量1.0-1.5公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗2叶1心期适量喷施多效唑，培育多蘖壮秧。2.适时移栽，合理密植。秧龄不超过30天，株行距16.7厘米×26.7厘米，每穴插2粒谷苗，亩插基本苗8万左右。3.科学管理肥水。该品种对氮肥较敏感，一般亩施纯氮12-13公斤，氮磷钾比例为1:0.5:1。浅水插秧，薄水分蘖，亩苗数达到18万时及时晒田，孕穗至抽穗扬花期保持深水层，后期保持田间湿润至成熟。4.病虫害防治。重点防治稻瘟病，注意防治纹枯病、白叶枯病、稻曲病和螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植。

7.珍糯2号（区试代号：永盛香糯2号）

申请者：湖北省农业科学院粮食作物研究所

育种者：湖北省农业科学院粮食作物研究所、孝感市农业科学院、襄阳市农业技术推广中心、孝感市农业技术推广中心

品种来源：黄科香1号/十里香糯

品质产量：2024-2025年参加湖北省中糯组品种区域试验，米质经农业农村部食品质检验测试中心（武汉）测定，出糙率79.0%，整精米率65.7%，阴糯米率0%，直链淀粉含量1.6%，胶稠度100毫米，碱消值5.4级，白度1级，长宽比3.0，达到农业行业标准《食用稻品种品质》三级。两年区域试验平均亩产589.4公斤，比对照扬辐糯4号增产8.5%。其中：2024年亩产578.1公斤，比扬辐糯4号增产6.3%；2025年亩产600.6公斤，比扬辐糯4号增产10.8%。2025年生产试验平均亩产641.5公斤，比对照扬辐糯4号增产5.2%。

特征特性：属中熟偏迟常规中粳糯品种。株型适中，植株较矮，分蘖力较强，生长势较旺。叶色绿，剑叶短、斜举。穗层整齐，谷粒中长，稃尖无色。后期熟相较好。区域试验中株高105.4厘米，亩有效穗20.7万，穗长21.5厘米，每穗总粒数168.3粒，每穗实粒数143.3粒，结实率85.1%，千粒重22.37克，全生育期130.2天，比对照扬辐糯4号短1.0天。病害鉴定为稻瘟病综合指数2.7，稻瘟损失率最高级3级，中抗稻瘟病；白叶枯病1级，抗白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病。耐热性3级，耐冷性7级。

栽培要点：1.适时播种，培育壮秧。鄂北4月下旬至5月上旬播种，江汉平原、鄂东5月中下旬播种，大田一般亩用种量2.0-2.5公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗2叶1心期和移栽前5-7天每亩施尿素5公斤。2.适时移栽，插足基本苗。秧龄25天以内，株行距16.7厘米×26.7厘米，每穴插3-4粒谷苗，亩插基本苗8万左右。3.科学管理肥水。重施底肥，早施追肥，增施磷钾肥，后期慎施氮肥，一般亩施纯氮12公斤，氮磷钾比例为1:0.5:0.8。浅水插秧，寸水返青，薄水促蘖，移栽后20-25天视苗情逐步晒田控苗，晒田应多次轻晒防倒伏，孕穗至抽穗扬花期保持浅水层，齐穗后灌足水，后期干干湿湿，直到黄熟。4.病虫害防治。苗期注意防治稻蓟马，大田注意防治纹枯病、稻曲病、稻瘟病、白叶枯病和螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植，稻瘟病常发区、重发区不宜种植。

8.珍两优 1621（区试代号：珍两优 1621）

申请者：华中农业大学

育种者：华中农业大学

品种来源：华6516S×华珍121

品质产量：2023-2024年参加湖北省早熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村

部食品质量检验测试中心(武汉)测定,出糙率79.1%,整精米率61.6%,垩白粒率10%,垩白度2.8%,直链淀粉含量15.3%,胶稠度63毫米,碱消值6.1级,透明度2级,长宽比3.6,达到农业行业标准《食用稻品种品质》二级。两年区域试验平均亩产593.4公斤,比对照黄华占增产5.5%。其中:2023年亩产609.4公斤,比黄华占增产4.2%;2024年亩产577.4公斤,比黄华占增产6.9%。2025年生产试验平均亩产643.6公斤,比对照黄华占增产9.9%。

特征特性:属早熟籼型两系杂交中稻品种。株型适中,分蘖力中等。叶色绿,剑叶中长、直立。穗层整齐,谷粒长形,稃尖无色。后期熟相好。区域试验中株高116.8厘米,亩有效穗21.3万,穗长25.2厘米,每穗总粒数140.0粒,每穗实粒数116.6粒,结实率83.3%,千粒重27.18克,全生育期110.7天,比对照黄华占短0.5天。病害鉴定为稻瘟病综合指数3.1,稻瘟损失率最高级5级,中感稻瘟病;白叶枯病5级,中感白叶枯病;纹枯病9级,高感纹枯病;稻曲病5级,中感稻曲病。耐热性3级,耐冷性3级。

栽培要点:1.适时播种。5月下旬至6月上旬播种,大田一般亩用种量2.0-2.5公斤,播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗3-4叶期及时查苗补苗。2.科学除草。播种前5天、播种后3天及时除草。3.科学管理肥水。施足底肥,控施氮肥,增施磷钾肥,一般亩施纯氮9-11公斤,氮磷钾比例为1:0.5:0.8。浅水勤灌促分蘖,够苗及时晒田防倒伏,孕穗至抽穗扬花期保持深水层,后期干干湿湿,直至黄熟。4.病虫害防治。注意防治纹枯病、稻曲病、稻瘟病、白叶枯病和稻蓟马、螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围:适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植。

9.珍两优 1821 (区试代号: 珍两优 1821)

申请者: 华中农业大学

育种者: 华中农业大学

品种来源: 华5818S×华珍121

品质产量: 2024-2025年参加湖北省早熟中稻组品种区域试验,米质经农业农村部食品质量检验测试中心(武汉)测定,出糙率79.8%,整精米率64.8%,垩白粒率16%,垩白度2.8%,直链淀粉含量16.1%,胶稠度61毫米,碱消值6.0级,透明度2级,长宽比3.3,达到农业行业标准《食用稻品种品质》二级。两年区域试验平均亩产631.6公斤,比对照黄华占增产13.3%。其中:2024年亩产619.5公斤,比黄华占增产15.1%;2025年亩产643.7公斤,比黄华占增产11.6%。2025年生产试验平均亩产651.5公斤,比对照黄华占增产11.4%。

特征特性:属早熟籼型两系杂交中稻品种。株型适中,分蘖力较强,生长势旺。叶色绿,剑叶中长、内卷、挺直。穗层整齐,谷粒长形,稃尖无色。后期熟相好。区域试验中株高121.9厘米,亩有效穗21.1万,穗长24.9厘米,每穗总粒数152.2粒,每穗

实粒数126.5粒，结实率83.1%，千粒重26.61克，全生育期110.5天，比对照黄华占长0.2天。病害鉴定为稻瘟病综合指数2.1，稻瘟损失率最高级1级，抗稻瘟病；白叶枯病5级，中感白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病；稻曲病7级，感稻曲病。耐热性3级，耐冷性5级。

栽培要点：1.适时播种。5月下旬至6月上旬播种，大田一般亩用种量2.0-2.5公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗3-4叶期及时查苗补苗。2.科学除草。播种前5天、播种后3天及时除草。3.科学管理肥水。施足底肥，控施氮肥，增施磷钾肥，一般亩施纯氮9-11公斤，氮磷钾比例为1:0.5:0.8。浅水勤灌促分蘖，够苗及时晒田防倒伏，孕穗至抽穗扬花期保持深水层，后期干干湿湿，直至黄熟。4.病虫害防治。注意防治纹枯病、稻曲病、稻瘟病、白叶枯病和稻蓟马、螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植。

10.E 农香两优 57（区试代号：411S/宜恢 57）

申请者：湖北昌凯种业科技有限公司、宜昌市农业科学研究院、湖北省农业科学院粮食作物研究所

育种者：湖北昌凯种业科技有限公司、宜昌市农业科学研究院、湖北省农业科学院粮食作物研究所

品种来源：E农香11S×宜恢57

品质产量：2024-2025年参加湖北省早熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验检测中心（武汉）测定，出糙率78.8%，整精米率60.0%，垩白粒率18%，垩白度4.8%，直链淀粉含量15.7%，胶稠度68毫米，碱消值3.2级，透明度1级，长宽比3.5。两年区域试验平均亩产609.9公斤，比对照黄华占增产9.2%。其中：2024年亩产597.5公斤，比黄华占增产10.6%；2025年亩产622.2公斤，比黄华占增产7.9%。2025年生产试验平均亩产624.8公斤，比对照黄华占增产9.6%。

特征特性：属中熟籼型两系杂交中稻品种。株型适中，分蘖力较强，生长势旺。叶色绿，剑叶微内卷、斜举。穗层整齐，谷粒长形，稃尖无色。后期熟相好。区域试验中株高119.0厘米，亩有效穗21.3万，穗长23.2厘米，每穗总粒数157.0粒，每穗实粒数129.7粒，结实率82.6%，千粒重24.37克，全生育期116.0天，比对照黄华占长5.4天。病害鉴定为稻瘟病综合指数5.9，稻瘟损失率最高级9级，高感稻瘟病；白叶枯病1级，抗白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病。耐热性3级，耐冷性7级。

栽培要点：1.适时播种。5月中下旬播种，大田一般亩用种量2.0-2.5公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗3-4叶期及时查苗补苗。2.科学除草。播种前5天、播种后3天及时除草。3.科学管理肥水。重施底肥，早施追肥，后期酌施穗肥，一般亩施纯氮10-12公斤、五氧化二磷5-6公斤、氯化钾10-12公斤。浅水分蘖，够苗及时晒田，孕穗至抽

穗扬花期保持深水层，灌浆期保持田面有水，忌断水过早。4.病虫害防治。重点防治稻瘟病，注意防治纹枯病、稻曲病、白叶枯病和稻蓟马、螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植，稻瘟病常发区、重发区不宜种植。

11.香两优 69（区试代号：香两优 69）

申请者：湖北荆楚种业科技有限公司、湖北荆楚水稻产业技术研究院有限公司、湖北农发种业集团有限公司

育种者：湖北荆楚种业科技有限公司、湖北荆楚水稻产业技术研究院有限公司、湖北农发种业集团有限公司

品种来源：荆香1S×R69

品质产量：2024-2025年参加湖北省早熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验检测中心（武汉）测定，出糙率78.8%，整精米率63.1%，垩白粒率15%，垩白度2.4%，直链淀粉含量16.6%，胶稠度61毫米，碱消值6.4级，透明度1级，长宽比3.8，达到农业行业标准《食用稻品种品质》二级。两年区域试验平均亩产590.3公斤，比对照黄华占增产5.1%。其中：2024年亩产567.7公斤，比黄华占增产3.9%；2025年亩产612.8公斤，比黄华占增产6.2%。2025年生产试验平均亩产631.7公斤，比对照黄华占增产7.9%。

特征特性：属中熟偏早籼型两系杂交中稻品种。株型适中，分蘖力较强，生长势较旺。叶色绿，剑叶中长、半直立。穗层整齐，谷粒长形，稃尖无色。后期熟相好。区域试验中株高121.2厘米，亩有效穗22.3万，穗长24.8厘米，每穗总粒数152.0粒，每穗实粒数120.4粒，结实率79.2%，千粒重23.31克，全生育期115.1天，比对照黄华占长4.6天。病害鉴定为稻瘟病综合指数2.3，稻瘟损失率最高级1级，抗稻瘟病；白叶枯病5级，中感白叶枯病；纹枯病9级，高感纹枯病；稻曲病5级，中感稻曲病。耐热性7级，耐冷性5级。

栽培要点：1.适时播种，注意预防高温热害。5月下旬至6月上旬播种，大田一般亩用种量1.5-2.0公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗3-4叶期及时查苗补苗。2.科学除草。播种后3天、秧苗3叶1心期和分蘖期及时除草。3.科学管理肥水。重施底肥，早施分蘖肥，增施磷钾肥，一般亩施纯氮10-11公斤，氮磷钾比例为1:0.5:0.8。浅水勤灌促分蘖，够苗晒田防倒伏，孕穗至抽穗扬花期保持浅水层，后期干干湿湿，直至黄熟。4.病虫害防治。注意防治纹枯病、白叶枯病、稻曲病、稻瘟病和螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植。

12.益两优 1046（区试代号：益两优 1046）

申请者：黄冈市农业科学院

育种者：黄冈市农业科学院、湖北农益生物科技有限公司、湖北省农业科学院粮食作物研究所

品种来源：益110S×GR1046

品质产量：2024-2025年参加湖北省早熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验测试中心（武汉）测定，出糙率80.2%，整精米率67.2%，垩白粒率20%，垩白度4.2%，直链淀粉含量17.6%，胶稠度59毫米，碱消值5.6级，透明度1级，长宽比3.2，达到农业行业标准《食用稻品种品质》三级。两年区域试验平均亩产591.4公斤，比对照黄华占增产5.9%。其中：2024年亩产569.2公斤，比黄华占增产5.4%；2025年亩产613.5公斤，比黄华占增产6.4%。2025年生产试验平均亩产627.3公斤，比对照黄华占增产7.4%。

特征特性：属早熟籼型两系杂交中稻品种。株型适中，分蘖较强，生长势旺。叶色绿，剑叶较短、内卷、直立。穗层整齐，谷粒长形，稃尖无色。后期熟相好。区域试验中株高120.2厘米，亩有效穗22.2万，穗长23.3厘米，每穗总粒数151.3粒，每穗实粒数126.2粒，结实率83.4%，千粒重23.23克，全生育期110.6天，与对照黄华占相当。病害鉴定为稻瘟病综合指数2.8，稻瘟损失率最高级3级，中抗稻瘟病；白叶枯病5级，中感白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病；稻曲病5级，中感稻曲病。耐热性5级，耐冷性5级。

栽培要点：1.适时播种，注意预防高温热害。5月下旬至6月中旬播种，大田一般亩用种量1.5-2.0公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗3-4叶期及时查苗补苗。2.科学除草。播种前5天和播种后3天及时除草。3.科学管理肥水。施足底肥，控施氮肥，增施磷钾肥，一般亩施纯氮11-13公斤，氮磷钾比例为1:0.5:1。浅水勤灌促分蘖，够苗及时晒田防倒伏，孕穗至抽穗扬花期保持深水层，后期干干湿湿，直至黄熟。4.病虫害防治。注意防治纹枯病、稻曲病、白叶枯病、稻瘟病和螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植。

13.楚粤丝苗（区试代号：楚粤丝苗）

申请者：湖北吾谷丰粮农业科技有限公司

育种者：湖北吾谷丰粮农业科技有限公司

品种来源：鄂丰丝苗/丰粤占

品质产量：2024-2025年参加湖北省早熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验测试中心（武汉）测定，出糙率78.9%，整精米率67.9%，垩白粒率14%，垩白度4.6%，直链淀粉含量17.0%，胶稠度50毫米，碱消值6.5级，透明度1级，长宽比3.3，达到农业行业标准《食用稻品种品质》三级。两年区域试验平均亩产600.4公

斤，比对照黄华占增产9.3%。其中：2024年亩产593.2公斤，比黄华占增产10.2%；2025年亩产607.5公斤，比黄华占增产8.5%。2025年生产试验平均亩产616.6公斤，比对照黄华占增产7.9%。

特征特性：属中熟偏早籼型常规中稻品种。株型适中，生长势旺。叶色绿，剑叶中长、直立。穗层整齐，谷粒长形，稃尖无色。后期熟相好。区域试验中株高115.8厘米，亩有效穗22.5万，穗长23.1厘米，每穗总粒数170.7粒，每穗实粒数139.4粒，结实率81.7%，千粒重21.39克，全生育期114.5天，比对照黄华占长3.7天。病害鉴定为稻瘟病综合指数3.4，稻瘟损失率最高级3级，中抗稻瘟病；白叶枯病5级，中感白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病；稻曲病7级，感稻曲病。耐热性3级，耐冷性5级。

栽培要点：1.适时播种。5月中下旬播种，大田一般亩用种量2.5公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗3-4叶期及时查苗补苗。2.科学除草。播种前5天、播种后3天、秧苗3叶1心期和分蘖期及时除草。3.科学管理肥水。施足底肥，早施追肥，增施磷钾肥和锌肥、硅肥，适当控制氮肥，一般亩施纯氮10公斤，氮磷钾比例为1: 0.5: 1。秧苗2叶期前保持田面湿润，秧苗3叶期后浅水勤灌，促根壮蘖，分蘖盛期及时晒田控蘖，孕穗至抽穗扬花期保持深水层，后期干干湿湿，直至黄熟。4.病虫害防治。苗期注意防治稻蓟马和矮缩病，大田重点防治稻曲病，注意防治纹枯病、白叶枯病、稻瘟病和螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植。

14.恩优 109（区试代号：恩优 496）

申请者：湖北泽隆农业科技有限公司、恩施土家族苗族自治州农业科学院（硒应用技术与产品开发研究院）

育种者：湖北泽隆农业科技有限公司、恩施土家族苗族自治州农业科学院（硒应用技术与产品开发研究院）

品种来源：恩 4A×泽恢 109

品质产量：2022-2023 年参加湖北省恩施州早中熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验检测中心（武汉）测定，出糙率 80.4%，整精米率 68.0%，垩白粒率 8%，垩白度 1.5%，直链淀粉含量 17.5%，胶稠度 63 毫米，碱消值 6.5 级，透明度 2 级，长宽比 2.8，达到农业行业标准《食用稻品种品质》二级。两年区域试验平均亩产 558.9 公斤，比对照绵 5 优 142 增产 5.6%。其中：2022 年亩产 585.8 公斤，比绵 5 优 142 增产 4.5%；2023 年亩产 532.0 公斤，比绵 5 优 142 增产 6.6%。2024 年生产试验平均亩产 586.3 公斤，比对照绵 5 优 142 增产 5.6%。

特征特性：属中熟籼型三系杂交中稻品种。株型适中，分蘖力强，生长势旺。叶色绿，剑叶中长、直立。穗层整齐，谷粒长形，稃尖紫色，无芒。后期熟相好。区域

试验中株高 101.8 厘米，亩有效穗 15.9 万，穗长 24.4 厘米，每穗总粒数 156.1 粒，每穗实粒数 130.9 粒，结实率 83.9%，千粒重 29.50 克，全生育期 157.3 天，比对照绵 5 优 142 短 2.5 天。病害鉴定为稻瘟病综合指数 3.2，穗瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；纹枯病 9 级，高感纹枯病。耐热性 5 级，耐冷性 5 级。

栽培要点：1.适时播种。3 月下旬至 4 月上旬播种，大田一般亩用种量 0.8-1.0 公斤，采用早育早发等保温育秧技术，培育带蘖壮秧，播种前做好种子和苗床消毒。2.合理密植。秧龄 30 天左右，株行距 16.7 厘米×26.7 厘米，亩栽 1.5 万穴左右，每穴插 2 粒谷苗，亩插基本苗 8-10 万。3.合理施肥。施足底肥，早施苗肥，巧施穗肥，补施粒肥，亩施纯氮 12-15 公斤，分蘖肥应在插秧后 10 天内施用。4.水分管理。浅水促蘖，够苗搁田，湿润分化，薄水扬花，干湿灌浆，适期断水。5.综合防治病虫害。苗期注意防治立枯病、恶苗病等病虫害，大田注意防治纹枯病、稻瘟病、稻曲病和稻秆潜蝇、螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省恩施州海拔 1200 米以下稻区作中稻种植。

15.E 农香两优香 99（区试代号：E 农香 11S/鄂香 99）

申请者：湖北汇楚智生物科技有限公司、湖北省农业科学院粮食作物研究所

育种者：湖北汇楚智生物科技有限公司、湖北省农业科学院粮食作物研究所、湖北汇谷智种业有限公司、湖北洪山实验室

品种来源：E 农香 11S×鄂香 99

品质产量：2024-2025 年参加湖北省晚稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验测试中心（武汉）测定，出糙率 79.3%，整精米率 66.7%，垩白粒率 6%，垩白度 1.0%，直链淀粉含量 16.5%，胶稠度 77 毫米，碱消值 6.6 级，透明度 1 级，长宽比 4.3，达到农业行业标准《食用稻品种品质》一级。两年区域试验平均亩产 573.0 公斤，比对照泰优 398 增产 4.3%。其中：2024 年亩产 566.6 公斤，比泰优 398 增产 3.3%；2025 年亩产 579.4 公斤，比泰优 398 增产 5.3%。2025 年生产试验平均亩产 622.7 公斤，比对照泰优 398 增产 6.8%。

特征特性：属早熟籼型两系杂交晚稻品种。株高、株型适中，分蘖力较强。剑叶中长、直立。穗层整齐，着粒均匀，谷粒细长形，稃尖无色。后期熟相较好。区域试验中株高 114.5 厘米，亩有效穗 21.0 万，穗长 25.0 厘米，每穗总粒数 157.5 粒，每穗实粒数 126.8 粒，结实率 80.5%，千粒重 25.02 克，全生育期 113.3 天，比对照泰优 398 长 3.7 天。病害鉴定为稻瘟病综合指数 5.7，稻瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；白叶枯病 3 级，中抗白叶枯病；纹枯病 7 级，感纹枯病。耐冷性 5 级。

栽培要点：1.适时早播，培育壮秧。6 月 18-20 日播种，大田一般亩用种量 1.5-2.0 公斤，播种前用咪鲜胺浸种。2.及时移栽，合理密植。秧龄 25-28 天，株行距 16.7 厘米

×20.0厘米，每穴插2-3粒谷苗。3.科学管理肥水。施足基肥，早施追肥，中后期看苗补施穗肥，一般亩施纯氮11-12公斤，氮磷钾比例为1:0.5:1。浅水移栽，深水返青，浅水分蘖，够苗晒田防倒伏，寸水抽穗扬花，遇到低温寒潮可灌深水，干湿灌浆成熟，收割前7天断水。4.病虫害防治。注意防治稻瘟病、纹枯病、稻曲病、白叶枯病和螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省双季稻区作晚稻种植。

16.70 优科泰占（区试代号：1070A/元恢 236）

申请者：湖北省农业科学院粮食作物研究所

育种者：湖北省农业科学院粮食作物研究所、中国科学院华南植物园、广州市番禺区农业科学研究所

品种来源：1070A×科泰占

品质产量：2024-2025年参加湖北省晚稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验测试中心（武汉）测定，出糙率81.0%，整精米率65.5%，垩白粒率17%，垩白度3.2%，直链淀粉含量18.5%，胶稠度63毫米，碱消值6.6级，透明度1级，长宽比3.6，达到农业行业标准《食用稻品种品质》三级。两年区域试验平均亩产571.0公斤，比对照泰优398增产4.0%。其中：2024年亩产577.3公斤，比泰优398增产5.3%；2025年亩产564.7公斤，比泰优398增产2.7%。2025年生产试验平均亩产606.8公斤，比对照泰优398增产3.6%。

特征特性：属早熟籼型三系杂交晚稻品种。株高、株型适中，分蘖力较强。剑叶细长、直立。穗层整齐，着粒均匀，谷粒细长形，稃尖无色。后期熟相较好。区域试验中株高115.4厘米，亩有效穗20.1万，穗长25.6厘米，每穗总粒数176.0粒，每穗实粒数131.9粒，结实率74.9%，千粒重25.80克，全生育期113.2天，比对照泰优398长3.6天。病害鉴定为稻瘟病综合指数3.8，稻瘟损失率最高级5级，中感稻瘟病；白叶枯病5级，中感白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病。耐冷性7级。

栽培要点：1.适时早播，注意预防低温冷害。6月20日左右播种，大田一般亩用种量1.5-2.0公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗2叶1心期和移栽前5-7天各亩施尿素5公斤。2.及时移栽，插足基本苗。秧龄25天左右，株行距16.7厘米×20.0厘米，每穴插2-3粒谷苗，亩插基本苗8万左右。3.科学管理肥水。施肥以基肥为主，追肥为辅，一般亩施纯氮10公斤，氮磷钾比例为1:0.5:0.8。浅水插秧，寸水活蔸返青，薄水促蘖，插秧后20-25天左右时视苗情逐步晒田控苗，晒田应多次轻晒防倒伏，孕穗至抽穗扬花期保持浅水层，齐穗后灌足水。后期干干湿湿，直到黄熟。4.病虫害防治。注意防治稻瘟病、纹枯病、稻曲病、白叶枯病和螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省双季稻区作晚稻种植。

17.鄂香粳 66（区试代号：鄂粳 66）

申请者：湖北省农业科学院粮食作物研究所

育种者：湖北省农业科学院粮食作物研究所、湖北洪山实验室

品种来源：鄂香2号/扬大长粒粳

品质产量：2024-2025年参加湖北省晚稻品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验测试中心（武汉）测定，出糙率82.5%，整精米率70.5%，垩白粒率11%，垩白度2.0%，直链淀粉含量18.4%，胶稠度72毫米，碱消值7.0级，透明度2级，长宽比2.8，有香味，达到农业行业标准《食用稻品种品质》二级。两年区域试验平均亩产580.0公斤，比对照鄂晚17增产11.8%。其中：2024年亩产562.1公斤，比鄂晚17增产9.9%；2025年亩产597.9公斤，比鄂晚17增产13.7%。2025年生产试验平均亩产568.2公斤，比对照鄂晚17增产10.2%。

特征特性：属粳型常规晚稻品种。株高、株型适中，分蘖力中等。剑叶短、窄、直立。着粒均匀，谷粒长形，稃尖无色。后期熟相较好。区域试验中株高91.5厘米，亩有效穗20.7万，穗长19.6厘米，每穗总粒数131.5粒，每穗实粒数107.8粒，结实率82.0%，千粒重28.19克，全生育期118.3天，比对照鄂晚17短3.7天。病害鉴定为稻瘟病综合指数5.4，稻瘟损失率最高级7级，感稻瘟病；白叶枯病5级，中感白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病；稻曲病7级，感稻曲病。耐冷性5级。

栽培要点：1.适时播种，培育壮秧。6月18-25日播种，大田一般亩用种量3.5-4.0公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。2.适时移栽，合理密植。秧龄25天以内，株行距13.3厘米×20.0厘米，每穴插3-4粒谷苗，亩插基本苗13万左右。3.科学管理肥水。施肥以底肥为主，追肥为辅，早施分蘖肥，视苗情酌施穗肥，一般亩施纯氮12-15公斤，氮磷钾比例为1:0.5:1.2。浅水插秧，深水活棵，薄水分蘖，够苗晒田，孕穗至抽穗扬花期保持浅水层，后期干湿交替，收获前7天左右断水，切忌断水过早。4.病虫害防治。苗期注意防治稻蓟马，大田重点防治稻曲病，注意防治稻瘟病、纹枯病、白叶枯病和螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省双季稻区作晚稻种植，稻瘟病常发区、重发区不宜种植。

18.鄂香粳 118（区试代号：鄂粳香 118）

申请者：武汉隆福康农业发展有限公司

育种者：武汉隆福康农业发展有限公司、湖北省农业科学院粮食作物研究所

品种来源：鄂香2号/甬优4949

品质产量：2024-2025年参加湖北省晚稻品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验测试中心（武汉）测定，出糙率80.7%，整精米率72.2%，垩白粒率25%，垩白度4.4%，直链淀粉含量17.6%，胶稠度60毫米，碱消值6.8级，透明度2级，长宽比

3.0, 有香味, 达到农业行业标准《食用稻品种品质》三级。两年区域试验平均亩产553.3公斤, 比对照鄂晚17增产6.7%。其中: 2024年亩产552.5公斤, 比鄂晚17增产8.0%; 2025年亩产554.1公斤, 比鄂晚17增产5.4%。2025年生产试验平均亩产534.9公斤, 比对照鄂晚17增产5.7%。

特征特性: 属粳型常规晚稻品种。株型紧凑, 株高适中, 分蘖力中等。剑叶中长、直立。着粒较密, 谷粒长形, 稃尖无色。后期熟相较好。区域试验中株高87.7厘米, 亩有效穗22.1万, 穗长18.5厘米, 每穗总粒数138.7粒, 每穗实粒数112.8粒, 结实率81.3%, 千粒重24.21克, 全生育期114.2天, 比对照鄂晚17短7.8天。病害鉴定为稻瘟病综合指数4.6, 稻瘟损失率最高级5级, 中感稻瘟病; 白叶枯病7级, 感白叶枯病; 纹枯病7级, 感纹枯病; 稻曲病5级, 中感稻曲病。耐冷性7级。

栽培要点: 1.适时早播, 注意预防低温冷害。6月20日左右播种, 大田一般亩用种量1.8-2.0公斤, 播种前宜用咪鲜胺浸种。2.适时移栽, 合理密植。秧龄25天以内, 株行距13.3厘米×26.7厘米, 每穴插2-3粒谷苗。3.科学管理肥水。施肥以基肥为主, 一般亩施纯氮14公斤, 氮磷钾比例为1:0.5:0.8。浅水插秧, 寸水返青, 薄水促蘖, 够苗晒田, 孕穗至抽穗扬花期保持浅水层, 后期干湿交替, 直到黄熟。4.病虫害防治。苗期注意防治稻蓟马, 大田重点防治稻瘟病和稻曲病, 注意防治白叶枯病、纹枯病和螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围: 适于湖北省双季稻区作晚稻种植。

19.长雄246 (区试代号: 长雄246)

申请者: 湖北省种子集团有限公司

育种者: 湖北省种子集团有限公司、武汉大学

品种来源: 巴斯马蒂/长雄1880//长雄1880*2///粤抗1523

品质产量: 2024-2025年参加湖北省种子集团有限公司绿色通道早熟中稻组品种区域试验, 米质经农业农村部食品质量检验检测中心(武汉)测定, 出糙率77.5%, 整精米率63.0%, 垩白粒率28%, 垩白度4.9%, 直链淀粉含量16.5%, 胶稠度52毫米, 碱消值5.7级, 透明度2级, 长宽比3.7, 达到农业行业标准《食用稻品种品质》三级。两年区域试验平均亩产608.6公斤, 比对照黄华占增产9.8%。其中: 2024年亩产600.2公斤, 比黄华占增产12.2%; 2025年亩产616.9公斤, 比黄华占增产7.6%。2025年生产试验平均亩产604.2公斤, 比对照黄华占增产7.5%。

特征特性: 属中熟籼型常规中稻品种。株型适中, 分蘖力较强, 生长势旺。叶色绿, 剑叶中长、直立。穗层整齐, 谷粒长形, 稃尖无色, 无芒。区域试验中株高119.0厘米, 亩有效穗23.1万, 穗长24.5厘米, 每穗总粒数139.9粒, 每穗实粒数118.9粒, 结实率85.0%, 千粒重24.32克, 全生育期113.4天, 比黄华占长6.1天。病害鉴定为稻瘟

病综合指数6.4，稻瘟损失率最高级9级，高感稻瘟病；白叶枯病5级，中感白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病；稻曲病5级，中感稻曲病。耐热性5级，耐冷性7级。

栽培要点：1.适时播种。5月下旬至6月上旬播种，大田一般亩用种量3.0-4.0公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗3-4叶期及时查苗补苗。2.科学除草。播种前5天、播种后3天、秧苗3叶1心期和分蘖期及时除草。3.科学管理肥水。施足底肥，控施氮肥，增施磷钾肥，一般亩施纯氮10-12公斤，氮磷钾比例为1:0.5:0.8。浅水勤灌促分蘖，够苗及时晒田防倒伏，孕穗至抽穗扬花期保持深水层，后期干干湿湿，直至黄熟。4.病虫害防治。注意防治稻瘟病、纹枯病、稻曲病、白叶枯病和螟虫、稻飞虱、稻蓟马等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植，稻瘟病常发区、重发区不宜种植。

20.狮山11（区试代号：狮山11）

申请者：湖北省种子集团有限公司

育种者：湖北省种子集团有限公司、华中农业大学、湖北洪山实验室

品种来源：鄂中5号/中种R1607

品质产量：2024-2025年参加湖北省种子集团有限公司绿色通道早熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验检测中心（武汉）测定，出糙率78.9%，整精米率65.2%，垩白粒率35%，垩白度7.7%，直链淀粉含量16.2%，胶稠度60毫米，碱消值5.9级，透明度2级，长宽比3.2。两年区域试验平均亩产586.0公斤，比对照黄华占增产5.7%。其中：2024年亩产574.5公斤，比黄华占增产7.4%；2025年亩产597.4公斤，比黄华占增产4.2%。2025年生产试验平均亩产599.9公斤，比对照黄华占增产6.7%。

特征特性：属早熟籼型常规中稻品种。株型适中，分蘖力较强，生长势旺。叶色绿，剑叶中长、直立。穗层整齐，谷粒长形，稃尖无色，无芒。区域试验中株高116.7厘米，亩有效穗22.5万，穗长23.4厘米，每穗总粒数143.4粒，每穗实粒数121.5粒，结实率84.7%，千粒重22.93克，全生育期107.7天，比黄华占长0.4天。病害鉴定为稻瘟病综合指数3.2，稻瘟损失率最高级3级，中抗稻瘟病；白叶枯病5级，中感白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病。耐热性5级，耐冷性3级。

栽培要点：1.适时播种。5月下旬至6月上旬播种，大田一般亩用种量3.0-4.0公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗3-4叶期及时查苗补苗。2.及时除草。播种前5天、播种后3天、秧苗3叶1心期和分蘖期及时除草。3.科学管理肥水。施足底肥，控施氮肥，增施磷钾肥，一般亩施纯氮10-12公斤，氮磷钾比例为1:0.5:0.8。浅水返青，薄水分蘖，够苗晒田，孕穗至抽穗扬花期保持深水层，后期干干湿湿，直至黄熟。4.病虫害防治。注意防治纹枯病、白叶枯病、稻曲病、稻瘟病和螟虫、稻飞虱、稻蓟马等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植。

21.珞两优钰占（区试代号：珞两优钰占）

申请者：湖北惠民农业科技有限公司

育种者：湖北惠民农业科技有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院有限公司

品种来源：华珞 948S×钰占

品质产量：2023-2024 年参加湖北种业创新测试联合体迟熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验检测中心（武汉）测定，出糙率 78.7%，整精米率 68.6%，垩白粒率 17%，垩白度 5.0%，直链淀粉含量 18.5%，胶稠度 60 毫米，碱消值 6.5 级，透明度 1 级，长宽比 3.5，达到农业行业标准《食用稻品种品质》三级。两年区域试验平均亩产 656.5 公斤，比对照丰两优四号增产 6.2%。其中：2023 年平均亩产 662.3 公斤，比丰两优四号增产 4.8%；2024 年平均亩产 650.7 公斤，比丰两优四号增产 7.7%。2024 年生产试验平均亩产 662.9 公斤，比对照丰两优四号增产 6.8%。

特征特性：属中熟偏迟粳型两系杂交中稻品种。株型适中，生长势较旺。叶色绿，剑叶中长、略内卷、直立。穗层整齐，谷粒长形，稃尖无色，无芒。后期熟相好。区域试验中株高 127.6 厘米，亩有效穗 18.6 万，穗长 26.6 厘米，每穗总粒数 176.3 粒，每穗实粒数 149.8 粒，结实率 85.0%，千粒重 24.85 克，全生育期 133.5 天，比对照丰两优四号长 2.0 天。病害鉴定为稻瘟病综合指数 3.8，稻瘟损失率最高级 7 级，感稻瘟病；白叶枯病 7 级，感白叶枯病；纹枯病 7 级，感纹枯病；稻曲病 9 级，高感稻曲病。耐热性 3 级，耐冷性 3 级。

栽培要点：1.适时播种，培育壮秧。4 月中旬至 5 月下旬播种，秧田亩播种量 8-10 公斤，大田一般亩用种量 1.0-1.5 公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗 2 叶 1 心期和移栽前 5-6 天各亩施尿素 5 公斤。2.及时移栽，插足基本苗。秧龄 30 天左右，株行距 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷苗，亩插基本苗 6 万左右。3.科学管理肥水。大田一般亩施纯氮 12-13 公斤、五氧化二磷 5-6 公斤、氧化钾 10-12 公斤。寸水活兜，寸水返青，浅水分蘖，够苗晒田，孕穗至抽穗期保持浅水层，后期干干湿湿，遇高温或低温天气，注意灌深水减少危害，成熟期忌断水过早。4.病虫害防治。重点防治稻曲病，注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病和稻蓟马、螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植，稻瘟病常发区、重发区不宜种植。

22.桢两优 7068（区试代号：桢两优 7068）

申请者：湖北惠民农业科技有限公司

育种者：湖北惠民农业科技有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、

湖南亚华种业科学研究院有限公司

品种来源：华桢 387S×华恢 7068

品质产量：2023-2024 年参加湖北种业创新测试联合体迟熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验测试中心（武汉）测定，出糙率 79.3%，整精米率 67.7%，垩白粒率 15%，垩白度 3.0%，直链淀粉含量 14.4%，胶稠度 76 毫米，碱消值 6.2 级，透明度 1 级，长宽比 3.2，达到农业行业标准《食用稻品种品质》二级。两年区域试验平均亩产 634.4 公斤，比对照丰两优四号增产 4.4%。其中：2023 年平均亩产 637.5 公斤，比丰两优四号增产 4.3%；2024 年平均亩产 631.3 公斤，比丰两优四号增产 4.5%。2024 年生产试验平均亩产 658.2 公斤，比对照丰两优四号增产 6.7%

特征特性：属中熟偏迟粳型两系杂交中稻品种。株型适中，生长势较旺。叶色绿，剑叶中长、略内卷、直挺。穗层整齐，谷粒长形，稃尖无色，无芒。后期熟相好。区域试验中株高 123.7 厘米，亩有效穗 18.5 万，穗长 25.4 厘米，每穗总粒数 179.9 粒，每穗实粒数 147.0 粒，结实率 81.7%，千粒重 24.67 克，全生育期 133.5 天，比对照丰两优四号长 1.9 天。病害鉴定为稻瘟病综合指数 2.9，稻瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；白叶枯病 7 级，感白叶枯病；纹枯病 5 级，中感纹枯病；稻曲病 7 级，感稻曲病。耐热性 3 级，耐冷性 3 级。

栽培要点：1.适时播种，培育壮秧。4 月中旬至 5 月下旬播种。秧田亩播种量 8-10 公斤，大田一般亩用种量 1.0-1.5 公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗 2 叶 1 心期和移栽前 5-6 天各亩施尿素 5 公斤。2.及时移栽，插足基本苗。秧龄 30 天左右，株行距 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷苗，亩插基本苗 6-8 万。3.科学管理肥水。大田一般亩施纯氮 12-13 公斤、五氧化二磷 5-6 公斤、氧化钾 10-12 公斤。寸水活兜，寸水返青，浅水分蘖，够苗晒田，孕穗至抽穗期保持浅水层，后期干干湿湿，遇高温或低温天气，注意灌深水减少危害，成熟期忌断水过早。4.病虫害防治。重点防治稻曲病，注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病和稻蓟马、螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植。

23.台两优 203（区试代号：台两优 203）

申请者：中垦锦绣华农武汉科技有限公司

育种者：中垦锦绣华农武汉科技有限公司、南京翰林农业科技有限公司、四川台沃种业有限责任公司、广东省农业科学院水稻研究所

品种来源：台 S×恢恢 203

品质产量：2023-2024 年参加湖北种业创新测试联合体迟熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验测试中心（武汉）测定，出糙率 79.5%，整精米率 62.2%，垩白粒率 45%，垩白度 15.4%，直链淀粉含量 13.4%，胶稠度 69 毫米，碱消

值 4.8 级，透明度 3 级，长宽比 2.8。两年区域试验平均亩产 631.7 公斤，比对照丰两优四号增产 3.9%。其中，2023 年平均亩产 634.6 公斤，比丰两优四号增产 3.8%；2024 年平均亩产 628.7 公斤，比丰两优四号增产 4.1%。2024 年生产试验平均亩产 664.0 公斤，比对照丰两优四号增产 6.8%。

特征特性：属中熟偏迟粳型两系杂交中稻品种。株型适中。叶色绿，剑叶中长、宽、半直立。穗层整齐，谷粒长形，稃尖无色。后期熟相好。区域试验中株高 125.5 厘米，亩有效穗 16.2 万，穗长 24.9 厘米，每穗总粒数 227.0 粒，每穗实粒数 183.3 粒，结实率 80.8%，千粒重 24.88 克，全生育期 130.5 天，比对照丰两优四号短 1.1 天。病害鉴定为稻瘟病综合指数 3.9，稻瘟损失率最高级 9 级，高感稻瘟病；白叶枯病 3 级，中抗白叶枯病；纹枯病 7 级，感纹枯病；稻曲病 5 级，中感稻曲病。耐热性 5 级，耐冷性 5 级。

栽培要点：1.适时播种，培育壮秧。鄂北 4 月中下旬播种，鄂东和江汉平原 5 月 10 日左右播种，秧田亩播种量 8-10 公斤，大田一般亩用种量 1.0-1.5 公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗 2 叶 1 心期和移栽前 5-6 天各亩施尿素 5 公斤。2.及时移栽，插足基本苗。秧龄 30-35 天之间，株行距 13.3 厘米×30.0 厘米或 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 1-2 粒谷苗，亩插基本苗 6-8 万。3.科学管理肥水。大田一般亩施纯氮 12-13 公斤、五氧化二磷 5-6 公斤、氧化钾 10-12 公斤。浅水栽插，寸水返青，薄水分蘖，够苗晒田，孕穗至抽穗期保持浅水层，后期干干湿湿，遇高温或低温天气，注意灌深水减少危害，成熟期忌断水过早。4.病虫害防治。重点防治稻瘟病，注意防治白叶枯病、纹枯病、稻曲病和稻蓟马、螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植，稻瘟病常发区、重发区不宜种植。

24.田两优 125（区试代号：田两优 125）

申请者：湖北华田农业科技股份有限公司

育种者：湖北华田农业科技股份有限公司、华中农业大学、咸宁市农业科学院

品种来源：田 1S×R25

品质产量：2023 年参加湖北国英科企水稻联合体迟熟中稻组品种区域试验，2024 年参加湖北国创水稻科企联合体迟熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验测试中心（武汉）测定，出糙率 81.3%，整精米率 69.9%，垩白粒率 25%，垩白度 3.8%，直链淀粉含量 17.5%，胶稠度 65 毫米，碱消值 5.0 级，透明度 2 级，长宽比 3.1，达到农业行业标准《食用稻品种品质》三级。两年区域试验平均亩产 626.6 公斤，比对照丰两优四号增产 0.4%。其中：2023 年平均亩产 631.1 公斤，比丰两优四号减产 2.6%；2024 年平均亩产 622.0 公斤，比丰两优四号增产 3.7%。2024 年生产试验平均亩产 624.3

公斤，比对照丰两优四号增产1.4%。

特征特性：属中熟偏迟粳型两系杂交中稻品种。株型适中，分蘖力强，生长势旺。叶色绿，剑叶较窄、挺直。穗层较整齐，谷粒长形，稃尖无色，有少量短顶芒。区域试验中株高122.3厘米，亩有效穗17.7万，穗长24.5厘米，每穗总粒数194.7粒，每穗实粒数161.2粒，结实率82.7%，千粒重23.33克，全生育期130.7天，比丰两优四号短0.6天。病害鉴定为稻瘟病综合指数3.9，稻瘟损失率最高级3级，中抗稻瘟病；白叶枯病7级，感白叶枯病；纹枯病5级，中感纹枯病；稻曲病9级，高感稻曲病。耐热性3级，耐冷性3级。

栽培要点：1.适时稀播，培育壮秧。鄂北4月20-25日左右播种，江汉平原、鄂东一般5月15-20日播种，大田一般亩用种量1.0-1.5公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗2叶1心期和移栽前5-6天各亩施尿素5公斤。2.适时移栽，插足基本苗。秧龄20-25天，株行距16.7厘米×26.7厘米，每穴插2-3粒谷苗，亩插基本苗8万左右。3.科学管理肥水。施肥以基肥为主，追肥为辅，大田一般亩施纯氮12公斤，氮磷钾比例为1:0.5:0.8。浅水插秧，寸水活蔸返青，薄水促蘖，插秧后20-25天时视苗情逐步晒田控苗，晒田多次轻晒，孕穗至抽穗扬花期保持浅水层，齐穗后灌足水。后期干干湿湿，直到黄熟。4.综合防治病虫害。苗期注意防治稻蓟马，大田重点防治稻曲病，注意防治白叶枯病、纹枯病、稻瘟病和螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植。

25.琴两优 19（区试代号：琴两优 19）

申请者：湖北大学

育种者：湖北大学、湖北洪山实验室

品种来源：琴 04S×R19

品质产量：2024-2025年参加湖北国创水稻科企联合体迟熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验检测中心(武汉)测定，出糙率81.8%，整精米率72.4%，垩白粒率26%，垩白度6.5%，直链淀粉含量15.4%，胶稠度74毫米，碱消值4.3级，透明度1级，长宽比3.3。两年区域试验平均亩产679.4公斤，比对照丰两优四号增产8.6%。其中：2024年平均亩产664.1公斤，比丰两优四号增产8.3%；2025年平均亩产694.7公斤，比丰两优四号增产8.9%。2025年生产试验平均亩产663.3公斤，比对照丰两优四号增产7.5%。

特征特性：属中熟偏迟粳型两系杂交中稻品种。株型适中，分蘖力较强。叶色绿，剑叶较短、直立。穗层较整齐，谷粒长形，稃尖无色。区域试验中株高116.3厘米，亩有效穗19.5万，穗长23.1厘米，每穗总粒数189.8粒，每穗实粒数155.3粒，结实率81.8%，千粒重24.12克，全生育期132.5天，比丰两优四号长2.4天。病害鉴定为稻瘟病综合指

数2.6，稻瘟损失率最高级3级，中抗稻瘟病；白叶枯病7级，感白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病；稻曲病7级，感稻曲病。耐热性3级，耐冷性7级。

栽培要点：1.适时播种。4月下旬至5月上旬播种，大田一般亩用种量1.5公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗2叶1心期和移栽前5-6天各亩施尿素5公斤。2.适时移栽。秧龄30天左右，株行距20.0厘米×26.7厘米，每穴插2粒谷苗。3.科学管理肥水。施足底肥，控施氮肥，增施磷钾肥，一般亩施纯氮12公斤、五氧化二磷6公斤、氧化钾10公斤。浅水勤灌促分蘖，够苗及时晒田防倒伏，孕穗至抽穗扬花期保持深水层，后期干湿交替，成熟前一周断水。4.病虫害防治。重点防治稻曲病，注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病和螟虫、稻飞虱、稻蓟马等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植。

26.两优9023（区试代号：两优9023）

申请者：武汉国英种业有限责任公司

育种者：武汉国英种业有限责任公司、武汉大学

品种来源：宁11S×R9023

品质产量：2024-2025年参加湖北国创水稻科企联合体迟熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验检测中心(武汉)测定，出糙率79.6%，整精米率70.0%，垩白粒率32%，垩白度7.4%，直链淀粉含量14.9%，胶稠度67毫米，碱消值5.0级，透明度2级，长宽比3.0。两年区域试验平均亩产666.9公斤，比对照丰两优四号增产6.6%。其中：2024年平均亩产643.0公斤，比丰两优四号增产4.9%；2025年平均亩产690.7公斤，比丰两优四号增产8.3%。2025年生产试验平均亩产671.7公斤，比对照丰两优四号增产8.9%。

特征特性：属中熟偏迟粳型两系杂交中稻品种。株型适中，分蘖力强。叶色绿，剑叶中长、宽、直立。穗层较整齐，谷粒长形，稃尖无色。区域试验中株高120.3厘米，亩有效穗19.6万，穗长26.0厘米，每穗总粒数193.2粒，每穗实粒数162.0粒，结实率83.9%，千粒重23.30克，全生育期129.3天，比丰两优四号短0.8天。病害鉴定为稻瘟病综合指数2.8，稻瘟损失率最高级3级，中抗稻瘟病；白叶枯病7级，感白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病；稻曲病7级，感稻曲病。耐热性5级，耐冷性5级。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。4月中旬至5月下旬播种，大田一般亩用种量1.0-2.0公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。2.适时移栽。秧龄不超过28天，株行距16.7厘米×26.7厘米，亩插基本苗9-10万。3.科学管理肥水。一般亩施纯氮10-11公斤、五氧化二磷6公斤、氧化钾7公斤，后期严格控制氮肥，以防贪青倒伏。浅水分蘖，够苗晒田，有水孕穗，活水扬花，湿润灌浆，后期干湿管理，切忌断水过早。4.病虫害防治。重点防治稻曲病，注意防治稻瘟病、纹枯病、白叶枯病和螟虫、稻飞虱等病

虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植。

27.沪优 813（区试代号：节优 813）

申请者：黄冈市农业科学院

育种者：黄冈市农业科学院、湖北省农业技术推广总站、上海市农业生物基因中心

品种来源：沪早 5A×GR813

品质产量：2024-2025年参加湖北国创水稻科企联合体迟熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验检测中心(武汉)测定，出糙率80.1%，整精米率69.7%，垩白粒率29%，垩白度6.9%，直链淀粉含量17.2%，胶稠度65毫米，碱消值4.6级，透明度2级，长宽比2.8。两年区域试验平均亩产653.1公斤，比对照丰两优四号增产4.4%。其中：2024年平均亩产631.9公斤，比丰两优四号增产3.1%；2025年平均亩产674.2公斤，比丰两优四号增产5.7%。2025年生产试验平均亩产662.7公斤，比对照丰两优四号增产7.4%。

特征特性：属中熟籼型三系杂交中稻品种。株型适中，分蘖力较强，生长势旺。叶色绿，剑叶中长、直立。穗层较整齐，谷粒长形，稃尖无色。区域试验中株高125.3厘米，亩有效穗17.5万，穗长25.7厘米，每穗总粒数193.7粒，每穗实粒数159.4粒，结实率82.3%，千粒重27.45克，全生育期126.2天，比丰两优四号短3.9天。病害鉴定为稻瘟病综合指数3.0，稻瘟损失率最高级3级，中抗稻瘟病；白叶枯病7级，感白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病。耐热性5级，耐冷性7级。

栽培要点：1.适时适量播种，培育壮秧。按当地正常生产季节适时播种，一般在5月10日至15日播种，大田一般亩用种量1.0-1.5公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧田肥水管理按当地先进管理技术进行，培育带蘖壮秧。2.及时移栽，插足基本苗。秧龄25天以内，株行距16.7厘米×23.3厘米，每穴插2-3粒谷苗，亩插足基本苗8万左右。3.科学肥水管理。一般亩施纯氮13-14公斤、五氧化二磷6公斤、氧化钾10公斤。浅水勤灌，亩苗数达到28万左右时及时晒田，孕穗至抽穗扬花期保持深水层，后期干干湿湿，忌断水过早。4.病虫害防治。注意防治白叶枯病、纹枯病、稻瘟病、稻曲病和螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植。

28.众优 1527（区试代号：众优 1527）

申请者：湖北利众种业科技有限公司

育种者：湖北利众种业科技有限公司

品种来源：众 915A×R1227

品质产量：2024-2025年参加湖北国创水稻科企联合体迟熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验测试中心(武汉)测定，出糙率79.4%，整精米率67.3%，垩白粒率27%，垩白度5.5%，直链淀粉含量17.1%，胶稠度60毫米，碱消值6.6级，透明度2级，长宽比3.1。两年区域试验平均亩产651.7公斤，比对照丰两优四号增产4.2%。其中：2024年平均亩产631.9公斤，比丰两优四号增产3.1%；2025年平均亩产671.5公斤，比丰两优四号增产5.4%。2025年生产试验平均亩产657.4公斤，比对照丰两优四号增产6.6%。

特征特性：属中熟籼型三系杂交中稻品种。株型适中，分蘖力较强，生长势旺。叶色绿，剑叶较长、宽、直立。谷粒长形，稃尖无色。区域试验中株高124.2厘米，亩有效穗17.0万，穗长24.3厘米，每穗总粒数188.0粒，每穗实粒数160.0粒，结实率85.1%，千粒重26.91克，全生育期127.0天，比丰两优四号短3.2天。病害鉴定为稻瘟病综合指数4.4，稻瘟损失率最高级5级，中感稻瘟病；白叶枯病3级，中抗白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病；稻曲病5级，中感稻曲病。耐热性3级，耐冷性3级。

栽培要点：1.适时播种，培育壮秧。一般4月下旬至5月中旬播种，大田亩用种量1.5-2.0公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。2.适时移栽，合理密植。秧龄30天以内，株行距16.7厘米×20.0厘米，每穴插2-3粒谷苗，亩插基本苗7.5万以上。3.科学管理肥水。施肥以基肥为主，追肥为辅，一般亩施纯氮12公斤，氮磷钾比例为1:0.5:0.8。浅水插秧，寸水返青，薄水促蘖，插秧后30天内视苗情逐步晒田控苗防倒伏，孕穗至抽穗扬花期保持深水层，后期干干湿湿直到黄熟。4.病虫害防治。重点防治稻瘟病、纹枯病，注意防治白叶枯病、稻曲病和螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外稻瘟病轻发地区作中稻种植。

29.源两优2550（区试代号：源两优2550）

申请者：武汉武大天源生物科技股份有限公司

育种者：武汉武大天源生物科技股份有限公司、襄阳市农业科学院

品种来源：天源1425S×源恢350

品质产量：2024-2025年参加湖北种业创新测试联合体早熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验测试中心(武汉)测定，出糙率80.4%，整精米率71.1%，垩白粒32%，垩白度7.1%，直链淀粉含量18.6%，胶稠度70毫米，碱消值6.5级，透明度2级，长宽比2.8。两年区域试验平均亩产599.0公斤，比对照黄华占增产7.8%。其中：2024年平均亩产579.1公斤，比黄华占增产6.2%；2025年平均亩产618.8公斤，比黄华占增产9.4%。2025年生产试验平均亩产633.7公斤，比对照黄华占增产8.6%。

特征特性：属早熟籼型两系杂交中稻品种。株型适中。叶色绿，剑叶较短、挺直。穗层整齐，谷粒长形，稃尖无色，无芒。区域试验中株高126.9厘米，亩有效穗20.7万，

穗长23.4厘米，每穗总粒数161.3粒，每穗实粒数136.9粒，结实率84.9%，千粒重24.59克，全生育期112.4天，比对照黄华占长0.5天。病害鉴定为稻瘟病综合指数4.2，稻瘟损失率最高级5级，中感稻瘟病；白叶枯病7级，感白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病；稻曲病7级，感稻曲病。耐热性3级，耐冷性5级。

栽培要点：1.适时播种。5月下旬至6月上旬播种，大田一般亩用种量2.0-2.3公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。2.科学除草。播种后2-3天和3叶1心期及时除草，后期视情况除草。3.科学管理肥水。施足底肥，早施追肥，增施磷钾肥，适当控制氮肥，一般亩施纯氮10-11公斤，氮磷钾比例为1:0.5:1。秧苗2叶期前保持田面湿润，秧苗3叶期后浅水勤灌，促根壮蘖，分蘖盛期及时晒田控蘖，孕穗至抽穗扬花期及时灌水，后期湿润灌溉，干干湿湿，防止倒伏。4.病虫害防治。重点防治稻曲病，注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病和螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植。

30.玉两优329（区试代号：玉两优329）

申请者：武汉弘耕种业有限公司

育种者：武汉弘耕种业有限公司、广州优能达稻米科技有限公司

品种来源：玉3S×优恢329

品质产量：2022-2023年参加湖北种业创新测试联合体早熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验检测中心(武汉)测定，出糙率79.2%，整精米率56.5%，垩白粒率33%，垩白度5.7%，直链淀粉含量14.4%，胶稠度60毫米，碱消值4.3级，透明度2级，长宽比3.3。两年区域试验平均亩产634.7公斤，比对照黄华占增产11.0%。其中：2022年平均亩产617.0公斤，比黄华占增产11.0%；2023年平均亩产652.3公斤，比黄华占增产10.9%。2023年生产试验平均亩产634.6公斤，比对照黄华占增产14.2%。

特征特性：属早熟籼型两系杂交中稻品种。株型适中。叶色绿，剑叶较长、直立。谷粒长形，稃尖无色，无芒。区域试验中株高119.8厘米，亩有效穗22.7万，穗长24.4厘米，每穗总粒数155.6粒，每穗实粒数127.6粒，结实率82.0%，千粒重24.37克，全生育期112.3天，比对照黄华占长1.7天。病害鉴定为稻瘟病综合指数5.4，稻瘟损失率最高级9级，高感稻瘟病；白叶枯病7级，感白叶枯病；纹枯病9级，高感纹枯病。耐热性3级，耐冷性5级。

栽培要点：1.适时播种。5月下旬至6月上旬播种，大田一般亩用种量2.0-2.5公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗3-4叶期及时查苗补苗。2.科学除草。播种前5天和播种后3天及时除草。3.科学管理肥水。施足底肥，控施氮肥，增施磷钾肥，一般亩施纯氮8-10公斤，氮磷钾比例为1:0.5:0.8。浅水勤灌促分蘖，够苗及时晒田防倒伏，孕穗至抽穗扬花期保持深水层，后期干干湿湿，直至黄熟。4.病虫害防治。重点防治

稻瘟病，注意防治纹枯病、白叶枯病、稻曲病和螟虫、稻飞虱、稻蓟马等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植，稻瘟病常发区、重发区不宜种植。

31. 半两优 371（区试代号：半两优 371）

申请者：湖北楚创高科农业有限公司

育种者：湖北楚创高科农业有限公司

品种来源：半楚 28S×华珍 371

品质产量：2024-2025年参加湖北国创水稻科企联合体早熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验检测中心(武汉)测定，出糙率80.4%，整精米率70.5%，垩白粒率39%，垩白度7.5%，直链淀粉含量15.4%，胶稠度54毫米，碱消值5.8级，透明度3级，长宽比3.2。两年区域试验平均亩产641.6公斤，比对照黄华占增产10.7%。其中：2024年平均亩产644.2公斤，比黄华占增产15.2%；2025年平均亩产639.0公斤，比黄华占增产6.6%。2025年生产试验平均亩产654.8公斤，比对照黄华占增产8.1%。

特征特性：属早熟籼型两系杂交中稻品种。株型适中，分蘖力较强，生长势旺。叶色绿，剑叶中长、直立。穗层较整齐，谷粒长形，稃尖无色。抗倒性一般。区域试验中株高114.3厘米，亩有效穗22.6万，穗长23.4厘米，每穗总粒数159.2粒，每穗实粒数134.2粒，结实率84.3%，千粒重24.33克，全生育期108.1天，比黄华占短4.6天。病害鉴定为稻瘟病综合指数2.9，稻瘟损失率最高级3级，中抗稻瘟病；白叶枯病3级，中抗白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病；稻曲病5级，中感稻曲病。耐热性3级，耐冷性5级。

栽培要点：1.适时播种。5月中旬至6月上旬播种，大田一般亩用种量2.0-2.5公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗3-4叶期及时查苗补苗。2.科学除草。播种前5天、播种后3天、秧苗3叶1心期和分蘖期及时除草。3.科学管理肥水。施足底肥，早施分蘖肥，增施磷钾肥，中后期控施氮肥，一般亩施纯氮10公斤，氮磷钾比例为1:0.5:0.8。浅水勤灌促分蘖，够苗及时晒田防倒伏，孕穗至抽穗扬花期保持深水层，后期干干湿湿，直至黄熟。4.病虫害防治。注意防治纹枯病、稻曲病、稻瘟病、白叶枯病和螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植。

32. 品种名称: 旱优 R2（区试代号：旱优 R2）

申请者：武汉武大天源生物科技股份有限公司

育种者：武汉武大天源生物科技股份有限公司、安徽筑农丰宝种业有限公司、上海市农业生物基因中心

品种来源：沪早 7A×筑农 R2

品质产量：2023-2024 年参加湖北种业创新测试联合体早熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验测试中心（武汉）测定，出糙率 79.8%，整精米率 60.4%，垩白粒率 16%，垩白度 5.0%，直链淀粉含量 16.5%，胶稠度 78 毫米，碱消值 6.0 级，透明度 1 级，长宽比 3.2，达到农业行业标准《食用稻品种品质》三级。两年区域试验平均亩产 606.9 公斤，比对照黄华占增产 7.4%。其中：2023 年平均亩产 635.8 公斤，比黄华占增产 8.1%；**2024 年平均亩产 578.0 公斤，比黄华占增产 6.6%。2024 年生产试验平均亩产 610.6 公斤，比对照黄华占增产 11.9%。**

特征特性：属早熟籼型三系杂交中稻品种。株型紧凑。叶色绿，剑叶较短、宽、直立。谷粒长形，稃尖无色，无芒。后期熟相好。区域试验中株高 124.5 厘米，亩有效穗 20.2 万，穗长 23.7 厘米，每穗总粒数 153.3 粒，每穗实粒数 127.3 粒，结实率 83.0%，千粒重 27.89 克，全生育期 108.7 天，比对照黄华占短 3.1 天。病害鉴定为稻瘟病综合指数 3.0，稻瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；白叶枯病 9 级，高感白叶枯病；纹枯病 7 级，感纹枯病。耐热性 3 级，耐冷性 5 级。

栽培要点：1.适时播种。5 月中下旬播种，大田一般亩用种量 2.0-2.25 公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗 3-4 叶期及时查苗补苗。2.科学除草。播种前 5 天和播种后 3 天及时除草。3.科学管理肥水。大田一般亩施纯氮 12 公斤、五氧化二磷 5-6 公斤、氧化钾 10-12 公斤。苗期湿润管理，分蘖期浅水促蘖，够苗晒田，孕穗至抽穗期保持浅水层，后期干干湿湿，遇高温或低温天气，注意灌深水减少危害，成熟期忌断水过早。4.病虫害防治。注意防治白叶枯病、纹枯病、稻瘟病、稻曲病和螟虫、稻飞虱、稻蓟马等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植。

33.粒粒优香占（区试代号：粒粒优至香占）

申请者：武汉弘耕种业有限公司

育种者：武汉弘耕种业有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、广西南宁华稻种业有限责任公司

品种来源：粒粒A×至香占

品质产量：2024-2025年参加湖北种业创新测试联合体早熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验测试中心（武汉）测定，出糙率78.4%，整精米率66.8%，垩白粒率36%，垩白度6.6%，直链淀粉含量16.3%，胶稠度65毫米，碱消值3.6级，透明度2级，长宽比4.3。两年区域试验平均亩产592.7公斤，比对照黄华占增产7.0%。其中：2024年平均亩产593.7公斤，比黄华占增产9.5%；2025年平均亩产591.7公斤，比黄华占增产4.6%。2025年生产试验平均亩产621.3公斤，比对照黄华占增产6.5%。

特征特性：属早熟籼型三系杂交中稻品种。株型适中。叶色绿，剑叶中长、直立。

穗层整齐，谷粒长形，稃尖无色。后期熟相好。区域试验中株高114.6厘米，亩有效穗22.6万，穗长23.0厘米，每穗总粒数146.6粒，每穗实粒数121.3粒，结实率82.7%，千粒重22.41克，全生育期111.5天，比对照黄华占短0.5天。病害鉴定为稻瘟病综合指数2.3，稻瘟损失率最高级1级，抗稻瘟病；白叶枯病7级，感白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病。耐热性5级，耐冷性5级。

栽培要点：1.适时播种。5月下旬至6月上旬播种，大田一般亩用种量1.5-2.0公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗3-4叶期及时查苗补苗。2.科学除草。播种前5天和播种后3天及时除草。3.科学管理肥水。施足底肥，控施氮肥，增施磷钾肥，一般亩施纯氮8-10公斤，氮磷钾比例为1:0.5:0.8。浅水勤灌促分蘖，够苗及时晒田防倒伏，孕穗至抽穗扬花期保持深水层，后期干干湿湿，直至黄熟。4.病虫害防治。注意防治白叶枯病、纹枯病、稻瘟病、稻曲病和螟虫、稻飞虱、稻蓟马等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植。

34.又得优油占（区试代号：又得优香油占）

申请者：武汉弘耕种业有限公司

育种者：武汉弘耕种业有限公司、广州优能达稻米科技有限公司

品种来源：又得A×桂农香油占

品质产量：2023-2024年参加湖北种业创新测试联合体早熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验检测中心(武汉)测定，出糙率77.7%，整精米率63.0%，垩白粒率7%，垩白度1.3%，直链淀粉含量16.2%，胶稠度77毫米，碱消值5.0级，透明度1级，长宽比4.3，达到农业行业标准《食用稻品种品质》三级。两年区域试验平均亩产603.6公斤，比对照黄华占增产7.6%。其中：2023年平均亩产626.1公斤，比黄华占增产8.1%；2024年平均亩产581.0公斤，比黄华占增产7.2%。2024年生产试验平均亩产597.2公斤，比对照黄华占增产7.5%。

特征特性：属早熟籼型三系杂交中稻品种。株型适中。叶色绿，剑叶长、宽、直立。穗层整齐，剑叶挺直，稃尖紫色，无芒。后期熟相好。区域试验中株高114.2厘米，亩有效穗22.8万，穗长25.0厘米，每穗总粒数164.2粒，每穗实粒数134.9粒，结实率82.2%，千粒重22.21克，全生育期113.6天，比对照黄华占长2.0天。病害鉴定为稻瘟病综合指数5.9，稻瘟损失率最高级9级，高感稻瘟病；白叶枯病7级，感白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病；稻曲病5级，中感稻曲病。耐热性7级，耐冷性7级。

栽培要点：1.适时播种，注意预防高温热害和低温冷害。5月下旬至6月上旬播种，大田一般亩用种量1.5-2.0公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗3-4叶期及时查苗补苗。2.科学除草。播种前5天和播种后3天及时除草。3.科学管理肥水。施足底肥，控施氮肥，增施磷钾肥，一般亩施纯氮8-10公斤，氮磷钾比例为1:0.5:0.8。浅水勤灌

促分蘖，够苗及时晒田防倒伏，孕穗至抽穗扬花期保持深水层，后期干干湿湿，直至黄熟。4.病虫害防治。重点防治稻瘟病，注意防治白叶枯病、纹枯病、稻曲病和螟虫、稻飞虱、稻蓟马等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植，稻瘟病常发区、重发区不宜种植。

35.沪优 616（区试代号：早优 616）

申请者：武汉武大天源生物科技股份有限公司

育种者：武汉武大天源生物科技股份有限公司，上海天谷生物科技股份有限公司

品种来源：沪早 7A×早恢 616

品质产量：2024-2025 年参加湖北种业创新测试联合体早熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验检测中心（武汉）测定，出糙率 79.3%，整精米率 68.3%，垩白粒率 29%，垩白度 5.4%，直链淀粉含量 15.3%，胶稠度 75 毫米，碱消值 3.9 级，透明度 2 级，长宽比 3.1。两年区域试验平均亩产 600.2 公斤，比对照黄华占增产 8.3%。其中：2024 年平均亩产 585.4 公斤，比黄华占增产 8.0%；2025 年平均亩产 614.9 公斤，比黄华占增产 8.7%。2025 年生产试验平均亩产 636.3 公斤，比对照黄华占增产 9.3%。

特征特性：属早熟籼型三系杂交中稻品种。株型适中，分蘖力较强，生长势旺。叶色淡绿，剑叶长、直立。穗层整齐，谷粒长形，稃尖无色，无芒。后期熟相好，抗倒性一般。区域试验中株高 124.0 厘米，亩有效穗 20.2 万，穗长 23.5 厘米，每穗总粒数 163.1 粒，每穗实粒数 134.1 粒，结实率 82.2%，千粒重 26.91 克，全生育期 108.2 天，比对照黄华占短 3.9 天。病害鉴定为稻瘟病综合指数 2.3，稻瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；白叶枯病 3 级，中抗白叶枯病；纹枯病 9 级，高感纹枯病。耐热性 5 级，耐冷性 5 级。

栽培要点：1.适时播种。5 月中下旬播种为宜，大田一般亩用种量 2.0-2.5 公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗 3-4 叶期及时查苗补苗。2.科学除草。播种前 5 天和播种后 3 天及时除草。3.科学管理肥水。底肥每亩施用复合肥 30 公斤，2 叶 1 心期亩追尿素 4 公斤，5 叶期亩追尿素 5 公斤，晒田复水后看苗追复合肥 5 公斤。苗期浅水勤灌促分蘖，够苗及时晒田，孕穗到抽穗扬花期保持浅水层，后期干湿交替，收获前一周断水。4.病虫害防治。注意防治纹枯病、稻瘟病、白叶枯病、稻曲病和稻蓟马、螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植。

36.多回 23（区试代号：多回 23）

申请者：武汉市农业科学院

育种者：武汉市农业科学院、武汉多倍体生物科技有限公司

品种来源：Dure(4X)/Sg99012(4X)

品质产量：2024-2025年参加湖北国创水稻科企联合体早熟中稻组品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验测试中心(武汉)测定，出糙率78.2%，整精米率67.5%，垩白粒率44%，垩白度14.1%，直链淀粉含量15.0%，胶稠度55毫米，碱消值6.0级，透明度3级，长宽比3.1。两年区域试验平均亩产610.7公斤，比对照黄华占增产5.4%。其中：2024年平均亩产589.5公斤，比黄华占增产5.4%；2025年平均亩产631.8公斤，比黄华占增产5.4%。2025年生产试验平均亩产642.7公斤，比对照黄华占增产6.1%。

特征特性：属早熟籼型常规中稻品种。株型适中，分蘖力强。叶色绿，剑叶较长、直立。穗层较整齐，谷粒长形，稃尖无色，无芒。区域试验中株高117.8厘米，亩有效穗24.6万，穗长24.1厘米，每穗总粒数167.7粒，每穗实粒数138.3粒，结实率82.5%，千粒重21.44克，全生育期113.5天，比对照黄华占长0.8天。病害鉴定为稻瘟病综合指数3.8，稻瘟损失率最高级5级，中感稻瘟病；白叶枯病5级，中感白叶枯病；纹枯病5级，中感纹枯病；稻曲病5级，中感稻曲病。耐热性5级，耐冷性7级。

栽培要点：1.适时播种。5月中旬至6月初播种，大田一般亩用种量4.0-5.0公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。秧苗3-4叶期及时查苗补苗。2.科学除草。播种前5天、播种后3天、秧苗3叶1心期和分蘖期及时除草。3.科学管理肥水。施足底肥，早施分蘖肥，中后期控释氮肥，一般亩施纯氮10公斤，氮磷钾比例为1:0.5:0.8。浅水勤灌促分蘖，够苗及时晒田，孕穗至抽穗扬花期保持深水层，后期干干湿湿，直至黄熟。4.病虫害防治。注意防治稻瘟病、纹枯病、稻曲病、白叶枯病和螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外稻瘟病轻发区作中稻种植。

37.E 农香两优 178（区试代号：E 农香两优 178）

申请者：湖北省农业科学院粮食作物研究所、湖北汇楚智生物科技有限公司

育种者：湖北省农业科学院粮食作物研究所、湖北汇楚智生物科技有限公司

品种来源：E农香11S×R78

品质产量：2024-2025年参加湖北高档优质稻组特殊类型品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验测试中心（武汉）测定，出糙率77.7%，整精米率56.0%，垩白粒率30%，垩白度5.0%，直链淀粉含量15.5%，胶稠度86毫米，碱消值5.8级，透明度2级，长宽比3.8，达到农业行业标准《食用稻品种品质》三级。经农业农村部食品质量检验测试中心（武汉）测定，稻米食用品质感官评分90分，根据《粮油检验稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法》，食用品质感官评价为好。两年区域试验平均亩产615.1公斤，比对照黄华占增产10.2%。其中：2024年平均亩产606.0公斤，比黄华占增产12.1%；2025年平均亩产624.1公斤，比黄华占增产8.5%。2025

年生产试验平均亩产 623.7 公斤，比对照黄华占增产 10.0%。

特征特性：属早熟籼型两系杂交中稻品种。株型适中，茎秆粗壮。叶色绿，剑叶长、宽、直立。穗层整齐，谷粒长形，稃尖无色。区域试验中株高 120.8 厘米，亩有效穗 17.6 万，穗长 24.2 厘米，每穗总粒数 172.2 粒，每穗实粒数 136.7 粒，结实率 79.4%，千粒重 29.98 克，全生育期 119.5 天，比对照黄华占长 1.7 天。病害鉴定为稻瘟病综合指数 6.4，稻瘟病 9 级，高感稻瘟病；白叶枯病 5 级，中感白叶枯病；纹枯病 7 级，感纹枯病。耐热性 5 级，耐冷性 7 级。

栽培要点：1.适时播种，培育壮秧。5月中旬至6月上旬播种，秧田亩播种量8-10公斤，大田一般亩用种量1.0-1.5公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。2.及时移栽，合理密植。秧龄25天以内，株行距16.7×26.7厘米，每穴插2-3粒谷苗，亩插基本苗6-8万。3.科学施肥。施足基肥，早施追肥，中后期看苗补施穗粒肥，一般亩施纯氮11-12公斤，氮磷钾比例为1.0:0.5:0.8。浅水移栽，深水返青，亩苗数达20万左右时及时晒田，孕穗至抽穗扬花期保持深水层，后期干湿交替至灌浆成熟。4.病虫害防治。重点防治稻瘟病，注意防治纹枯病、白叶枯病、稻曲病和螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作中稻种植，稻瘟病常发区、重发区不宜种植。

38.惠华润珠 36（区试代号：惠华润珠 36）

申请者：武汉惠华三农种业有限公司

育种者：武汉惠华三农种业有限公司

品种来源：五山丝苗/鄂中 5 号

品质产量：2024-2025 年参加湖北省虾稻组特殊类型品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验检测中心（武汉）测定，出糙率 79.3%，整精米率 68.3%，垩白粒率 8%，垩白度 1.5%，直链淀粉含量 16.9%，胶稠度 64 毫米，碱消值 6.4 级，透明度 2 级，长宽比 3.1，达到农业行业标准《食用稻品种品质》二级。两年区域试验平均亩产 601.4 公斤，比对照黄华占增产 2.9%。其中：2024 年平均亩产 596.9 公斤，比黄华占增产 4.9%；2025 年平均亩产 605.8 公斤，比黄华占增产 1.0%。2025 年生产试验平均亩产 677.7 公斤，比对照黄华占增产 10.5%。

特征特性：属中熟偏早籼型常规中稻品种。株型适中，生长势较旺。叶色绿，剑叶较短、直立。穗层整齐，谷粒长形，稃尖无色。区域试验中株高 110.1 厘米，亩有效穗 20.9 万，穗长 22.9 厘米，每穗总粒数 166.8 粒，每穗实粒数 137.3 粒，结实率 82.3%，千粒重 22.08 克，全生育期 121.7 天，比对照黄华占长 3.2 天。病害鉴定为稻瘟病综合指数 4.1，稻瘟损失率最高级 7 级，感稻瘟病；白叶枯病 5 级，中感白叶枯病；纹枯病 7 级，感纹枯病；稻曲病 5 级，中感稻曲病。耐热性 3 级，耐冷性 3 级。

栽培要点：1.适时播种。鄂北地区5月20日至6月5日播种，江汉平原、鄂东5月25日至6月10日播种，大田一般亩用种量3.0-4.0公斤，播种前宜用咪鲜胺浸种。2.适龄移栽，合理密植。秧龄20-25天，株行距16.7×20.0厘米或16.7×23.3厘米，每穴插3-4粒谷苗，亩插基本苗8-10万。3.合理用肥，控氮增钾。底肥亩施复合肥40公斤，移栽6天后亩施7.5公斤尿素作分蘖肥，晒田后复水时亩施7.5公斤氯化钾作穗粒肥。4.科学管水。寸水插秧，浅水分蘖，亩总苗数到28-30万时及时晒田，孕穗期至抽穗扬花期灌深水，灌浆期浅水灌溉，后期干湿交替，收割前一周排水落干。5.病虫害防治。注意防治稻瘟病、纹枯病、稻曲病、白叶枯病和稻蓟马、螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省鄂西南以外地区作虾稻种植。

39.益两优159（区试代号：E136S/RT159）

申请者：黄冈市农业科学院

育种者：黄冈市农业科学院、湖北农益生物科技有限公司、湖北省农业科学院粮食作物研究所

品种来源：益136S×RT159

品质产量：2023-2024年参加湖北省再生稻组特殊类型品种区域试验，米质经农业农村部食品质量检验检测中心（武汉）测定，出糙率77.9%，整精米率49.4%，垩白粒率34%，垩白度7.9%，直链淀粉含量18.3%，胶稠度46毫米，碱消值5.1级，透明度2级，长宽比3.1。两年区域试验两季平均亩总产量883.8公斤，其中头季平均亩产609.9公斤，再生季平均亩产274.0公斤，两季加权平均产量为408.3公斤，比对照天两优616增产2.3%。其中：2023年两季平均亩总产量863.8公斤，其中头季平均亩产623.2公斤，再生季平均亩产240.6公斤，两季加权平均亩产393.6公斤，比天两优616增产3.0%；2024年两季平均亩总产量903.8公斤，其中头季平均亩产596.5公斤，再生季平均亩产307.3公斤，两季加权平均亩产423.0公斤，比天两优616增产1.7%。2024年生产试验两季平均总产量1008.0公斤，其中头季平均亩产654.3公斤，再生季平均亩产353.7公斤，两季加权平均亩产473.9公斤，比对照天两优616增产7.0%。

特征特性：属籼型两系杂交中稻品种。株型适中。叶色绿，剑叶较短、直立。穗大粒多，着粒均匀，谷粒椭圆形，稃尖无色。后期熟相好。区域试验中株高116.2厘米，亩有效穗20.0万，穗长24.0厘米，每穗总粒数173.5粒，每穗实粒数141.7粒，结实率81.7%，千粒重23.61克，全生育期207.1天，比天两优616长1.3天。病害鉴定为稻瘟病综合指数3.4，稻瘟损失率最高级5级，中感稻瘟病；白叶枯病5级，中感白叶枯病；纹枯病7级，感纹枯病；稻曲病5级，中感稻曲病。耐热性3级，耐冷性5级。

栽培要点：1.适时播种。3月20-25日播种，大田亩用种量2.0-2.5公斤，播种前宜

用咪鲜胺浸种。2.适时移栽，合理密植。秧龄25-28天，株行距16.7厘米×20.0厘米，每穴插2粒谷苗，亩插基本苗8-10万。3.科学肥水管理。头季亩施纯氮14公斤左右，氮磷钾的比例为1: 0.5: 1，磷肥全部底施；钾肥底肥施50%，其余的50%在晒田复水时与氮肥一起追施；氮肥底肥占40%-50%，返青肥占20%-30%，晒田复水后施穗肥20%-30%。在施用底肥时，亩补施锌肥1公斤和硅肥4公斤。再生季施好促芽肥和促蘖肥，促芽肥在头季收割前10-15天施用，亩施尿素7.5-10公斤和钾肥7.5公斤，促蘖肥在头季收后2-3天内早施，亩施尿素5-10公斤。头季浅水分蘖，提早晒田，有水孕穗，扬花后跑马水养根保叶促灌浆；再生季前期浅水促蘖，中后期干湿交替，以间歇灌溉、湿润为主。4.适当高留稻桩。头季90%熟时及时收割，人工收割留茬高度与倒2叶叶枕平齐为宜，机收控制40厘米留茬高度。5.病虫害防治。注意防治稻瘟病、稻曲病、纹枯病、白叶枯病和螟虫、稻飞虱等病虫害。

适宜范围：适于湖北省再生稻适宜种植区作再生稻种植。

小麦

1.扶襄麦 231(区试代号：扶襄麦 231)

申请者：湖北扶轮农业科技开发有限公司

育种者：湖北扶轮农业科技开发有限公司、襄阳市农业科学院、湖北洪山实验室

品种来源：鄂麦 19/扬麦 158//09 北 146

品质产量：2023-2025 年度参加湖北省小麦品种区域试验，品质经农业农村部谷物及制品质量检验检测中心(哈尔滨)测定，容重 842 克/升，粗蛋白含量(干基)12.87%，湿面筋含量 29.0%，吸水率 56.8%，稳定时间 12.2 分钟，最大拉伸阻力(Rm.135) 603 EU，拉伸面积 111 平方厘米。两年区域试验平均亩产 450.65 公斤，比对照郑麦 9023 增产 7.44%。其中：2023-2024 年度亩产 401.96 公斤，比郑麦 9023 增产 5.66%；2024-2025 年度亩产 499.33 公斤，比郑麦 9023 增产 8.91%。2025-2026 年度生产试验平均亩产 445.86 公斤，比对照郑麦 9023 增产 5.88%。

特征特性：属偏春性品种。幼苗生长半直立，分蘖力中等。株型半紧凑，茎秆蜡质重，穗下节长，旗叶长度中等、下披。穗长度中等，穗纺锤形，小穗着生密度中等，长芒，白壳，籽粒卵圆形、白粒、中等大小、半角质。区域试验中株高 77.2 厘米，亩有效穗 32.2 万，每穗实粒数 37.2 粒，千粒重 41.9 克，生育期 190.3 天，比对照郑麦 9023 迟熟 3.1 天。抗病性鉴定为中感赤霉病，高感条锈病，高感白粉病，中感纹枯病。抗倒性较好。

栽培要点：1.适时播种。10 月 25 日-11 月 10 日为宜。亩基本苗高肥水地块 13-15

万，中等肥力地块 16-18 万，中低产地块 18-20 万。晚播两天播种量增加 0.5 公斤。
2.科学施肥。一般亩施纯氮 10-12 公斤，五氧化二磷 6-8 公斤，氧化钾 5-7 公斤。磷、钾肥和 70%的氮肥基施，30%的氮肥作追肥。追肥不宜过晚，防止贪青晚熟。3.注意清沟防渍，控旺促壮，防止倒伏。4.注意防治赤霉病、条锈病、白粉病、纹枯病等病害。5.适时收获，防止穗发芽。

适宜范围：适于湖北省小麦产区种植。

2.漂麦 306(区试代号：鄂麦 DH151)

申请者：湖北省农业科学院植保土肥研究所

育种者：湖北省农业科学院植保土肥研究所、河南艾瑞泽农业科技有限公司

品种来源：(郑麦 9023/XMJB001) F₁DH 诱导

品质产量：2023-2025 年度参加湖北省小麦品种区域试验，品质经农业农村部谷物及制品质量检验检测中心(哈尔滨)测定，容重 832 克/升，粗蛋白含量(干基)15.43%，湿面筋含量 33.0%，吸水率 56.5%，稳定时间 13.4 分钟，最大拉伸阻力(Rm.135) 519 EU，拉伸面积 99 平方厘米。两年区域试验平均亩产 439.02 公斤，比对照郑麦 9023 增产 4.90%。其中：2023-2024 年度亩产 390.19 公斤，比郑麦 9023 增产 3.66%；2024-2025 年度亩产 487.84 公斤，比郑麦 9023 增产 5.92%。2025-2026 年度生产试验平均亩产 408.31 公斤，比对照郑麦 9023 增产 5.65%。

特征特性：属半冬性品种。幼苗绿色，半直立，分蘖中等，株型中等，茎秆蜡质轻，旗叶长、平举，穗下节长，穗纺锤形、中等大小、小穗着生密度中等、长芒、白壳，籽粒卵圆形、红粒、中等大小、籽粒饱满、半角质。区域试验中株高 85.6 厘米，亩有效穗 32.5 万，每穗实粒数 33.7 粒，千粒重 44.0 克，生育期 187.3 天，比郑麦 9023 迟熟 0.5 天。抗病性鉴定为中抗赤霉病，中感条锈病，中抗白粉病，中感纹枯病。抗倒性一般。

栽培要点：1.适时播种。鄂北 10 月 20 日至 11 月 5 日播种，鄂东南和江汉平原 10 月 25 日至 11 月 10 日播种，亩基本苗 15-18 万。2.科学施肥。施足底肥，氮、磷、钾肥配合施用。全生育期一般亩施纯氮 10-12 公斤、五氧化二磷 6-8 公斤、氧化钾 4-6 公斤。3.注意清沟防渍，控旺促壮，防止倒伏。4.注意防治赤霉病、条锈病、白粉病、纹枯病等病害。5.适时收获，防止穗发芽。

适宜范围：适于湖北省小麦产区种植。

3.鄂麦 037(区试代号：鄂 010416)

申请者：湖北省农业科学院粮食作物研究所

育种者：湖北省农业科学院粮食作物研究所

品种来源：先麦 8 号///郑麦 9023/鄂麦 11//扬麦 18

品质产量：2023-2025 年度参加湖北省小麦品种区域试验，品质经农业农村部谷物及制品质量检验检测中心(哈尔滨)测定，容重 799 克/升，粗蛋白含量(干基)13.95%，湿面筋含量 30.2%，吸水率 61.7%，稳定时间 4.1 分钟，最大拉伸阻力(Rm.135) 230 EU，拉伸面积 53 平方厘米。两年区域试验平均亩产 459.25 公斤，比对照郑麦 9023 增产 9.73%。其中：2023-2024 年度亩产 424.77 公斤，比郑麦 9023 增产 12.84%；2024-2025 年度亩产 493.72 公斤，比郑麦 9023 增产 7.19%。2025-2026 年度生产试验平均亩产 437.62 公斤，比对照郑麦 9023 增产 7.94%。

特征特性：属半冬性品种。幼苗生长半直立，分蘖力中等。株型半紧凑，茎秆蜡质轻，穗下节长，旗叶长度中等、上举。穗长度中，穗纺锤形，小穗着生密度中，芒长度中到长，白壳，籽粒卵圆形、红粒、中等大小、半角质。区域试验中株高 81.8 厘米，亩有效穗 33.5 万，每穗实粒数 35.3 粒，千粒重 43.0 克，生育期 188.4 天，比郑麦 9023 迟熟 1.6 天。抗病性鉴定为中感赤霉病，中感条锈病，高感白粉病，中感纹枯病。抗倒性较好。

栽培要点：1.适时播种。鄂北 10 月 20 日至 11 月 5 日播种，鄂东南和江汉平原 10 月 25 日至 11 月 10 日播种，亩基本苗 16-18 万。2.科学施肥。施足底肥，氮、磷、钾肥配合施用。全生育期一般亩施纯氮 11-13 公斤、五氧化二磷 6-8 公斤、氧化钾 4-6 公斤。3.注意清沟防渍，控旺促壮，防止倒伏。4.注意防治赤霉病、条锈病、白粉病、纹枯病等病害。5.适时收获，防止穗发芽。

适宜范围：适于湖北省小麦产区种植。

4.鄂麦 136(区试代号：H51995)

申请者：湖北省农业科学院粮食作物研究所

育种者：湖北省农业科学院粮食作物研究所

品种来源：DH6006/周 11550-Fhb1

品质产量：2023-2025 年度参加湖北省小麦品种区域试验，品质经农业农村部谷物及制品质量检验检测中心(哈尔滨)测定，容重 846 克/升，粗蛋白含量(干基)15.45%，湿面筋含量 35.0%，吸水率 59.0%，稳定时间 5.3 分钟，最大拉伸阻力(Rm.135) 256 EU，拉伸面积 70 平方厘米。两年区域试验平均亩产 441.38 公斤，比对照郑麦 9023 增产 5.92%。其中：2023-2024 年度亩产 390.22 公斤，比郑麦 9023 增产 4.08%；2024-2025 年度亩产 492.53 公斤，比郑麦 9023 增产 7.43%。2025-2026 年度生产试验平均亩产 411.6 公斤，比对照郑麦 9023 增产 6.50%。

特征特性：属偏半冬性品种。幼苗生长半直立，分蘖力中等。株型中等，茎秆蜡质强，穗下节间长度中等，旗叶短、上举。穗长度短到中，穗纺锤形，小穗着生密度中到密，长芒，白壳，籽粒卵圆形、白皮、中等大小、半角质。区域试验中株高 76.0

厘米，亩有效穗 32.5 万，每穗实粒数 35.5 粒，千粒重 44.9 克，生育期 189.2 天，比对照郑麦 9023 迟熟 2 天。抗病性鉴定为中感赤霉病，高感条锈病、白粉病和纹枯病。抗倒性中等。

栽培要点：1.适时播种。鄂北 10 月 20 日至 11 月 5 日播种，鄂东南和江汉平原 10 月 25 日至 11 月 10 日播种，亩基本苗 15-20 万。2.科学施肥。施足底肥，氮、磷、钾肥配合施用。全生育期一般亩施纯氮 10-12 公斤、五氧化二磷 6-8 公斤、氧化钾 5-6 公斤。3.注意清沟防渍，控旺促壮，防止倒伏。4.注意防治赤霉病、条锈病、白粉病、纹枯病等病害。5.适时收获，防止穗发芽。

适宜范围：适于湖北省小麦产区种植。

5.鄂麦 779(区试代号：小麦 0779)

申请者：孝感市农业科学院

育种者：孝感市农业科学院

品种来源：华麦 1168/乐麦 6 号

品质产量：2023-2025 年度参加湖北省小麦品种区域试验，品质经农业农村部谷物及制品质量检验检测中心(哈尔滨)测定，容重 842 克/升，粗蛋白含量(干基)14.62%，湿面筋含量 30.5%，吸水率 60.4%，稳定时间 29.8 分钟，最大拉伸阻力(Rm.135)758 EU，拉伸面积 149 平方厘米，主要品质指标达强筋小麦品质标准。两年区域试验平均亩产 444.40 公斤，比对照郑麦 9023 增产 6.38%。其中：2023-2024 年度亩产 389.61 公斤，比郑麦 9023 增产 3.92%；2024-2025 年度亩产 499.18 公斤，比郑麦 9023 增产 8.38%。2025-2026 年度生产试验平均亩产 459.18 公斤，比对照郑麦 9023 增产 7.76%。

特征特性：属偏春性品种。幼苗生长半直立，分蘖力中等。株型紧凑，茎秆蜡质弱到中，穗下节长，旗叶长度短到中、平展。穗长度中等，穗圆锥形，小穗着生密度中等，长芒，白壳，籽粒卵圆形、白粒、中等大小、角质。区域试验中株高 83.2 厘米，亩有效穗 33.9 万，每穗实粒数 35.2 粒，千粒重 42.2 克，生育期 187.9 天，比郑麦 9023 迟熟 1.0 天。抗病性鉴定为中感赤霉病，中感条锈病，中感纹枯病，高感白粉病。抗倒性一般。

栽培要点：1.适时播种。鄂北 10 月 25 日至 11 月 5 日播种，鄂东南和江汉平原 10 月 27 日至 11 月 10 日播种，亩基本苗 16-17 万。2.科学施肥。施足底肥，氮、磷、钾肥配合施用。全生育期一般亩施纯氮 10-12 公斤、五氧化二磷 6-8 公斤、氧化钾 4-6 公斤。3.注意清沟防渍，控旺促壮，防止倒伏。4.注意防治赤霉病、条锈病、白粉病、纹枯病等病害。5.适时收获，预防穗发芽。

适宜范围：适于湖北省小麦产区种植。

6.华漂麦 99 (区试代号：华麦 2212)

申请者：湖北洪山实验室

育种者：华中农业大学、湖北洪山实验室

品种来源：镇麦 9 号/襄麦 55

品质产量：2023-2025 年度参加湖北省小麦品种区域试验，品质经农业农村部谷物及制品质量检验检测中心(哈尔滨)测定，容重 830 克/升，粗蛋白含量(干基)16.80%，湿面筋含量 36.8%，吸水率 60.3%，稳定时间 12.1 分钟，最大拉伸阻力(Rm.135) 518 EU，拉伸面积 128 平方厘米，主要品质指标达强筋小麦品质标准。两年区域试验平均亩产 454.11 公斤，比对照郑麦 9023 增产 8.51%。其中：2023-2024 年度亩产 411.48 公斤，比郑麦 9023 增产 9.31%；2024-2025 年度亩产 496.73 公斤，比郑麦 9023 增产 7.85%。2025-2026 年度生产试验平均亩产 453.14 公斤，比对照郑麦 9023 增产 6.95%。

特征特性：属偏春性品种。幼苗生长半直立，分蘖力弱。株型松散，茎秆蜡质中等，穗下节长，旗叶长、平举。穗长，穗纺锤形，小穗着生密度稀到中，芒长度中到长，白壳，籽粒卵圆形、红粒、籽粒大、角质。区域试验中株高 85.1 厘米，亩有效穗 31.3 万，每穗实粒数 35.7 粒，千粒重 45.4 克，生育期 188.9 天，比对照郑麦 9023 迟熟 2.1 天。抗病性鉴定为中抗赤霉病，高感条锈病，高感白粉病，高感纹枯病。抗倒性较好。

栽培要点：1.适时播种。鄂北 10 月 25 日至 11 月 5 日播种，鄂东南和江汉平原 10 月 28 日至 11 月 10 日播种，亩基本苗 15-18 万。2.科学施肥。施足底肥，氮、磷、钾肥配合施用。全生育期一般亩施纯氮 10-12 公斤、五氧化二磷 6-8 公斤、氧化钾 4-6 公斤。3.注意清沟防渍，控旺促壮，防止倒伏。4.注意防治赤霉病、条锈病、白粉病、纹枯病等病害。5.适时收获，防止穗发芽。

适宜范围：适于湖北省小麦产区种植。

7.华田麦 10 号(区试代号：宁丰麦 10 号)

申请者：湖北华田农业科技股份有限公司

育种者：湖北华田农业科技股份有限公司

品种来源：扬麦 20/宁麦 20

品质产量：2023-2025 年度参加湖北省小麦品种区域试验，品质经农业农村部谷物及制品质量检验检测中心(哈尔滨)测定，容重 836 克/升，粗蛋白(干基) 14.44%，湿面筋含量 32.6%，吸水量 60.0%，稳定时间 20.0 分钟，最大拉伸阻力(Rm, 135) 667 EU，拉伸面积 147 平方厘米，主要品质指标达到强筋小麦品质标准。两年区域试验平均亩产 458.41 公斤，比对照郑麦 9023 增产 9.11%。其中：2023-2024 年度亩产 408.45 公斤，比郑麦 9023 增产 6.97%；2024-2025 年度亩产 508.37 公斤，比郑麦 9023 增产 10.89%。2025-2026 年度生产试验平均亩产 510.48 公斤，比对照郑麦 9023 增产

9.82%。

特征特性：属偏春性品种。幼苗生长半直立，株型松散，分蘖弱，茎秆蜡质轻，旗叶长度中等、平举，穗下节长，穗纺锤形、中等大小，小穗着生密、长芒、白壳，籽粒卵圆形、红粒、籽粒中等大小、较饱、半角质。区域试验中株高 82.9 厘米，亩有效穗 29.9 万，每穗实粒数 42.5 粒，千粒重 41.5 克，生育期 189.2 天，比郑麦 9023 迟熟 2.0 天。抗病性鉴定为中感赤霉病，中抗白粉病，高感条锈、纹枯病。抗倒性一般。

栽培要点：1.适时播种。适宜播期在 10 月下旬至 11 月上旬。亩基本苗 16-18 万。2.科学施肥。注意氮磷钾配合，重施基肥，早施苗肥，看苗追施拔节肥。全生育期一般亩施纯氮 10-12 公斤、五氧化二磷 6-8 公斤、氧化钾 4-5 公斤。3.注意清沟防渍，控旺促壮，防止早衰和倒伏。4.注意防治赤霉病、条锈病、白粉病、纹枯病等病害。5.适时收获，防止穗发芽。

适宜范围：适于湖北省小麦产区种植。

8.楚襄 40(区试代号：楚襄 40)

申请者：湖北扶轮农业科技开发有限公司

育种者：湖北扶轮农业科技开发有限公司、西北农林科技大学农学院

品种来源：西农 979/苏麦 3 号//西农 979///西农 235

品质产量：2024-2026 年度参加湖北省小麦品种区域试验，品质经农业农村部谷物及制品质量检验检测中心(哈尔滨)测定，容重 794 克/升，粗蛋白含量(干基)16.95%，湿面筋含量 37.1%，吸水率 62.1%，稳定时间 22.3 分钟，最大拉伸阻力(Rm.135)703 EU，拉伸面积 160 平方厘米，主要品质指标达强筋小麦品质标准。两年区域试验平均亩产 473.14 公斤，比对照鄂麦 006 增产 7.42%。其中：2024-2025 年度亩产 498.95 公斤，比鄂麦 006 增产 7.63%；2025-2026 年度亩产 447.33 公斤，比鄂麦 006 增产 7.18%。2025-2026 年度生产试验平均亩产 465.58 公斤，比对照鄂麦 006 增产 6.46%。

特征特性：属半冬性品种。幼苗生长半直立，分蘖力中等。株型紧凑，茎秆蜡质中等，穗下节间长度中等，旗叶短、上举。短穗，穗长方形，小穗着生密度中等，长芒，籽粒长圆形、白壳、中等大小、角质。区域试验中株高 74.2 厘米，亩有效穗 32.6 万，每穗实粒数 41.9 粒，千粒重 40.0 克，生育期 182.8 天，比对照鄂麦 006 早熟 0.1 天。抗病性鉴定为中感赤霉病，中感条锈病，中感纹枯病，高感白粉病。抗倒性中等。

栽培要点：1.适时播种。鄂北 10 月 20 日至 11 月 5 日播种，鄂东南和江汉平原 10 月 25 日至 11 月 10 日播种，亩基本苗 16-18 万。2.科学施肥。施足底肥，氮、磷、钾肥配合施用。全生育期一般亩施纯氮 11-13 公斤、五氧化二磷 6-8 公斤、氧化钾 4-6 公斤。3.注意清沟防渍，控旺促壮，防止倒伏。4.注意防治赤霉病、条锈病、白粉病、纹枯病等病害。5.适时收获，防止穗发芽。

适宜范围：适于湖北省小麦产区种植。

9.科麦 116(区试代号：科麦 116)

申请者：襄阳科卫农农业科技发展有限公司

育种者：襄阳科卫农农业科技发展有限公司、河南怀川种业有限责任公司

品种来源：郑麦 9023/怀川 916

品质产量：2023-2025 年度参加湖北省小麦鄂北组品种区域试验，品质经农业农村部谷物及制品质量检验检测中心（哈尔滨）测定，容重 858 克/升，粗蛋白含量（干基）14.7%，湿面筋含量 30.7%，吸水率 60.8%，稳定时间 14.9 分钟，最大拉伸阻力（Rm.135）813 EU，拉伸面积 193 平方厘米，主要品质指标达强筋小麦品质标准。两年区域试验平均亩产 488.29 公斤，比对照郑麦 9023 增产 3.10%。其中：2023-2024 年度亩产 437.97 公斤，比郑麦 9023 减产 3.33%；2024-2025 年度亩产 538.60 公斤，比郑麦 9023 增产 9.01%。2025-2026 年度生产试验平均亩产 454.77 公斤，比对照郑麦 9023 增产 8.10%。

特征特性：属半冬性品种。幼苗生长半直立，分蘖力强。株型半紧凑，茎秆蜡质中等，穗下节长，旗叶长度中等、上举。穗长度中等，穗纺锤形，小穗着生密度中等，长芒，白壳，籽粒卵圆形、白粒、中等大小、角质。区域试验中株高 78.7 厘米，亩有效穗 35.2 万，每穗实粒数 34.5 粒，千粒重 44.8 克，生育期 193.4 天，比对照郑麦 9023 迟熟 0.5 天。抗病性鉴定为中感赤霉病，中感条锈病，高感白粉病，高感纹枯病。抗倒性较好。

栽培要点：1.适时播种。鄂北 10 月 20 日至 11 月 5 日播种，亩基本苗 15-18 万。2.科学施肥。施足底肥，氮、磷、钾肥配合施用。全生育期一般亩施纯氮 12-14 公斤、五氧化二磷 6-8 公斤、氧化钾 4-6 公斤。3.注意清沟防渍，控旺促壮，防止倒伏。4.注意防治赤霉病、条锈病、白粉病、纹枯病等病害。5.适时收获，防止穗发芽。

适宜范围：适于湖北省北部小麦产区种植。

10.晶漂麦 998（区试代号：华麦 2089）

申请者：湖北洪山实验室

育种者：湖北洪山实验室、华中农业大学

品种来源：华麦 1223/华矮 01//加引 09/周麦 20

品质产量：2023-2025 年度参加湖北省小麦鄂北组品种区域试验，品质经农业农村部谷物及制品质量检验检测中心（哈尔滨）测定，容重 760 克/升，粗蛋白含量（干基）14.73%，湿面筋含量 30.8%，吸水率 61.7%，稳定时间 16.9 分钟，最大拉伸阻力（Rm.135）736 EU，拉伸面积 175 平方厘米，主要品质指标达强筋小麦品质标准。两年区域试验平均亩产 478.80 公斤，比对照郑麦 9023 增产 0.63%。其中：2023-2024 年

度亩产 443.75 公斤，比郑麦 9023 减产 3.00%；2024-2025 年度亩产 513.84 公斤，比郑麦 9023 增产 4.00%。2025-2026 年度生产试验平均亩产 422.46 公斤，比对照郑麦 9023 增产 5.19%。

特征特性：属半冬性品种。幼苗生长半直立，分蘖力强。株型半紧凑，茎秆蜡质中等，穗下节长度中等，旗叶长、下披。穗长，穗纺锤形，小穗着生密度中等，长芒，白壳，籽粒卵圆形、白粒、小、角质。区域试验中株高 78.5 厘米，亩有效穗 34.1 万，每穗实粒数 41.0 粒，千粒重 37.9 克，生育期 195.8 天，比对照郑麦 9023 迟熟 2.5 天。抗病性鉴定为中抗赤霉病，中感条锈病，中抗白粉病，高感纹枯病。抗倒性中等。

栽培要点：1.适时播种。鄂北 10 月 20 日至 11 月 5 日播种，亩基本苗 15-18 万。2.科学施肥。施足底肥，氮、磷、钾肥配合施用。全生育期一般亩施纯氮 10-12 公斤、五氧化二磷 6-8 公斤、氧化钾 4-6 公斤。3.注意清沟防渍，控旺促壮，防止倒伏。4.注意防治赤霉病、条锈病、白粉病、纹枯病等病害。5.适时收获，防止穗发芽。

适宜范围：适于湖北省北部小麦产区种植。

11.华漂麦 88（区试代号：华麦 2302）

申请者：湖北洪山实验室

育种者：湖北洪山实验室、华中农业大学

品种来源：太谷核不育轮回选择群体

品质产量：2023-2025 年度参加湖北省小麦鄂北组品种区域试验，品质经农业农村部谷物及制品质量检验检测中心（哈尔滨）测定，容重 842 克/升，粗蛋白含量（干基）14.44%，湿面筋含量 31.9%，吸水率 63.1%，稳定时间 20.1 分钟，最大拉伸阻力（Rm.135）639 EU，拉伸面积 143 平方厘米，主要品质指标达强筋小麦品质标准。两年区域试验平均亩产 512.06 公斤，比对照郑麦 9023 增产 7.62%。其中：2023-2024 年度亩产 510.46 公斤，比郑麦 9023 增产 11.58%；2024-2025 年度亩产 513.65 公斤，比郑麦 9023 增产 3.96%。2025-2026 年度生产试验平均亩产 444.54 公斤，比对照郑麦 9023 增产 5.42%。

特征特性：属半冬性品种。幼苗生长半直立，分蘖力中等。株型半紧凑，茎秆蜡质弱到中，穗下节间长度中等，旗叶长度短到中、下披。穗长度中等，穗纺锤形，小穗着生密度稀到中，芒长度中到长，白壳，籽粒卵圆形、白粒、籽粒大小中等、角质。区域试验中株高 76.8 厘米，亩有效穗 32.7 万，每穗实粒数 41.6 粒，千粒重 42.5 克，生育期 194.8 天，比对照郑麦 9023 迟熟 1.5 天。抗病性鉴定为中感赤霉病，中感条锈病，高感白粉病，中感纹枯病。抗倒性较好。

栽培要点：1.适时播种。鄂北 10 月 20 日至 11 月 5 日播种，亩基本苗 15-18 万。2.科学施肥。施足底肥，氮、磷、钾肥配合施用。全生育期一般亩施纯氮 10-12 公斤、

五氧化二磷 6-8 公斤、氧化钾 4-5 公斤。3.注意清沟防渍，控旺促壮，防止倒伏。4.注意防治赤霉病、条锈病、白粉病、纹枯病等病害。5.适时收获，防止穗发芽。

适宜范围：适于湖北省北部小麦产区种植。

12.楚丰 303(区试代号：楚丰 303)

申请者：湖北楚玉种业有限公司

育种者：湖北楚玉种业有限公司、湖北省农业科学院粮食作物研究所、河南福满多农业科技有限公司

品种来源：济麦 22/西农 979

品质产量：2023-2025 年度参加湖北省小麦鄂北组品种区域试验，品质经农业农村部谷物及制品质量检验检测中心（哈尔滨）测定，容重 832 克/升，粗蛋白含量（干基）14.53%，湿面筋含量 32.9%，吸水率 63.2%，稳定时间 5.9 分钟，最大拉伸阻力（Rm.135）210 EU，拉伸面积 59 平方厘米。两年区域试验平均亩产 520.45 公斤，比对照郑麦 9023 增产 9.39%。其中：2023-2024 年度亩产 486.18 公斤，比郑麦 9023 增产 6.27%；2024-2025 年度亩产 554.72 公斤，比郑麦 9023 增产 12.27%。2025-2026 年度生产试验平均亩产 452.80 公斤，比对照郑麦 9023 增产 5.60%。

特征特性：属半冬性品种。幼苗生长半直立，分蘖力中等。株型半紧凑，茎秆蜡质重，穗下节间长度短到中，旗叶短、上举。穗长度中等，穗纺锤形，小穗着生密度中等，芒长度短到中，白壳，籽粒卵圆形、白粒、中等大小、角质。区域试验中株高 72.8 厘米，亩有效穗 34.0 万，每穗实粒数 36.6 粒，千粒重 45.4 克，生育期 194.4 天，比对照郑麦 9023 迟熟 1.1 天。抗病性鉴定为中感赤霉病，中感条锈病，中感白粉病，高感纹枯病。抗倒性中等。

栽培要点：1. 适时播种。鄂北 10 月 20 日至 11 月 5 日播种，亩基本苗 16-18 万。2. 科学施肥。施足底肥，氮、磷、钾肥配合施用。全生育期一般亩施纯氮 10-12 公斤、五氧化二磷 6-8 公斤、氧化钾 5-6 公斤。3. 注意清沟防渍，控旺促壮，防止倒伏。4. 注意防治赤霉病、条锈病、白粉病、纹枯病等病害。5. 适时收获，防止穗发芽。

适宜范围：适于湖北省北部小麦产区种植。

13.鄂麦 038(区试代号：鄂麦 T18799)

申请者：湖北省农业科学院粮食作物研究所

育种者：湖北省农业科学院粮食作物研究所

品种来源：太谷核不育株/兰野 7-1

品质产量：2023-2025 年度参加湖北省小麦鄂北组品种区域试验，品质经农业农村部谷物及制品质量检验检测中心（哈尔滨）测定，容重 842 克/升，粗蛋白含量（干基）14.35%，湿面筋含量 32.7%，吸水率 62.4%，稳定时间 10.9 分钟，最大拉伸阻力

(Rm.135) 472 EU, 拉伸面积 96 平方厘米, 主要品质指标达中强筋小麦品质标准。两年区域试验平均亩产 528.91 公斤, 比对照郑麦 9023 增产 11.68%。其中: 2023-2024 年度亩产 510.37 公斤, 比郑麦 9023 增产 12.64%; 2024-2025 年度亩产 547.44 公斤, 比郑麦 9023 增产 10.80%。2024-2025 年度生产试验平均亩产 522.74 公斤, 比对照郑麦 9023 增产 10.05%。

特征特性: 属半冬性品种。幼苗生长半直立, 分蘖力中等。株型半紧凑, 茎秆蜡质轻, 穗下节中等, 旗叶中等、下披。穗长度中等, 穗长方形, 小穗着生密度稀, 长芒, 白壳, 籽粒长圆形、白粒、中等大小、角质。区域试验中株高 84.0 厘米, 亩有效穗 32.6 万, 每穗实粒数 36.9 粒, 千粒重 49.2 克, 生育期 196.3 天, 比对照郑麦 9023 迟熟 3.4 天。抗病性鉴定为中感赤霉病和条锈病, 高感白粉病和纹枯病。抗倒性一般。

栽培要点: 1.适时播种。鄂北 10 月 23 日至 11 月 5 日播种, 亩基本苗 16-18 万。2.科学施肥。施足底肥, 氮、磷、钾肥配合施用。全生育期一般亩施纯氮 11-13 公斤、五氧化二磷 6-8 公斤、氧化钾 4-6 公斤。3.注意清沟防渍, 控旺促壮, 防止倒伏。4.注意防治赤霉病、条锈病、白粉病、纹枯病等病害。5.适时收获, 防止穗发芽。

适宜范围: 适于湖北省北部小麦产区种植。

14.鄂麦 1067(区试代号: 鄂麦 1067)

申请者: 湖北省农业科学院粮食作物研究所

育种者: 湖北省农业科学院粮食作物研究所

品种来源: 荆麦 103/天 01-61

品质产量: 2023-2025 年度参加湖北省小麦科企创新测试联合体区域试验, 品质经农业农村部谷物及制品质量检验检测中心(哈尔滨)测定, 容重 838 克/升, 粗蛋白含量(干基) 16.08%, 湿面筋含量 36.0%, 吸水率 60.1%, 稳定时间 12.9 分钟, 最大拉伸阻力(Rm.135) 821 EU, 拉伸面积 164 平方厘米, 主要品质指标达强筋小麦品质标准。两年区域试验平均亩产 439.55 公斤, 比对照郑麦 9023 增产 5.55%。其中: 2023-2024 年度亩产 387.68 公斤, 比郑麦 9023 增产 3.37%; 2024-2025 年度亩产 491.41 公斤, 比郑麦 9023 增产 7.33%。2025-2026 年度生产试验平均亩产 416.10 公斤, 比对照郑麦 9023 增产 7.67%。

特征特性: 属半冬性品种。幼苗生长半直立, 分蘖力较强。株型紧凑, 茎秆蜡质中等, 穗下节间长度中等, 旗叶长度中等、上举。穗长度中等, 纺锤形, 小穗着生密度中等, 芒长度短到中, 白壳, 籽粒长圆形、白粒、中等大小、角质。区域试验中株高 74.2 厘米, 亩有效穗 34.4 万, 每穗实粒数 38.0 粒, 千粒重 41.3 克, 生育期 193.7 天, 比郑麦 9023 迟熟 1.1 天。抗病性鉴定为中感赤霉病, 高感条锈病, 中感白粉病, 高感纹枯病。抗倒性较好。

栽培要点：1. 适时播种。鄂北 10 月 20 日至 10 月 30 日播种，鄂东南和江汉平原 10 月 25 日至 11 月 5 日播种，亩基本苗 16-18 万。2. 科学施肥。施足底肥，氮、磷、钾肥配合施用。全生育期一般亩施纯氮 10-12 公斤、五氧化二磷 6-8 公斤、氧化钾 5-6 公斤。3. 注意清沟防渍，控旺促壮，防止倒伏。4. 注意防治赤霉病、条锈病、白粉病、纹枯病等病害。5. 适时收获，防止穗发芽。

适宜范围：适于湖北省小麦产区种植。

15.沅羲 2 号(区试代号：华 2109)

申请者：华中农业大学

育种者：华中农业大学

品种来源：鄂麦 23/华麦 1223//华矮 01/川麦 42

品质产量：2023-2025 年度参加湖北省小麦科企创新测试联合体品种区域试验，品质经农业农村部谷物及制品质量检验检测中心（哈尔滨）测定，容重 818 克/升，粗蛋白含量（干基）14.87%，湿面筋含量 32.2%，吸水率 52.6%，稳定时间 25.6 分钟，最大拉伸阻力（Rm.135）749 EU，拉伸面积 143 平方厘米。两年区域试验平均亩产 452.85 公斤，比对照郑麦 9023 增产 7.92%。其中：2023-2024 年度亩产 396.56 公斤，比郑麦 9023 增产 3.98%；2024-2025 年度亩产 509.14 公斤，比郑麦 9023 增产 11.21%。2025-2026 年度生产试验平均亩产 385.50 公斤，比对照郑麦 9023 增产 6.47%。

特征特性：属偏春性品种。幼苗生长半直立，分蘖力中等。株型中等，茎秆蜡质重，穗下节长，旗叶长、上举。穗长度中等，穗纺锤形，小穗着生密度中等，长芒，白壳，籽粒卵圆形、白粒、中等大小、饱满、半角质。区域试验中株高 81.5 厘米，亩有效穗 31.4 万，每穗实粒数 38.8 粒，千粒重 43.2 克，生育期 195.5 天，比郑麦 9023 迟熟 2.4 天。抗病性鉴定为中感赤霉病，高感条锈病，中感白粉病，高感纹枯病。抗倒性中等。

栽培要点：1.适时播种。鄂北 10 月 25 日至 11 月 5 日播种，鄂东南和江汉平原 10 月 28 日至 11 月 10 日播种，亩基本苗 16-18 万。2.科学施肥。施足底肥，氮、磷、钾肥配合施用。全生育期一般亩施纯氮 11-13 公斤、五氧化二磷 6-8 公斤、氧化钾 4-6 公斤。3.注意清沟防渍，控旺促壮，防止倒伏。4.注意防治赤霉病、条锈病、白粉病、纹枯病等病害。5.适时收获，防止穗发芽。

适宜范围：适于湖北省小麦产区种植。

16.龙麦 236(区试代号：龙麦 236)

申请者：湖北腾龙种业有限公司

育种者：湖北腾龙种业有限公司、襄阳市农业科学院

品种来源：辽春 10 号/扬麦 20

品质产量：2023-2025 年度参加湖北省小麦科企创新测试联合体区域试验，品质经农业农村部谷物及制品质量检验检测中心（哈尔滨）测定，容重 818 克/升，粗蛋白含量（干基）16.5%，湿面筋含量 35.7%，吸水率 60.1%，稳定时间 36.2 分钟，最大拉伸阻力（Rm.135）935 EU，拉伸面积 235 平方厘米，主要品质指标达强筋小麦品质标准。两年区域试验平均亩产 415.37 公斤，比对照郑麦 9023 减产 1.01%。其中：2023-2024 年度亩产 366.22 公斤，比郑麦 9023 减产 3.98%；2024-2025 年度亩产 464.51 公斤，比郑麦 9023 增产 1.46%。2025-2026 年度生产试验平均亩产 437.67 公斤，比对照郑麦 9023 增产 7.08%。

特征特性：属偏春性品种，幼苗生长半直立，分蘖力强。株型松散，茎秆蜡质轻，穗下节长，旗叶长度中等、上举。穗短、纺锤形，小穗着生密度中等，长芒、白壳，籽粒长圆形、红粒、偏小、角质。区域试验中株高 80.9 厘米，亩有效穗 33.6 万，每穗实粒数 36.9 粒，千粒重 40.0 克，生育期 194.1 天，比对照郑麦 9023 迟熟 1.0 天。抗病性鉴定为中感赤霉病、条锈病和白粉病，高感纹枯病。抗倒性较好。

栽培要点：1.适时播种。鄂北 10 月 25 日-11 月 5 日，鄂东南、江汉平原 10 月 28 日-11 月 10 日。2.播量适中。亩基本苗以 14-16 万，亩播量 10-12 公斤。3.合理用肥。中等肥力田块，一般亩施纯氮 11-13 公斤、五氧化二磷 7-8 公斤、氧化钾 4-6 公斤。4.注意防治防治赤霉病、条锈病、白粉病、纹枯病等病害。5.加强田管、控旺促壮，防止倒伏及防渍控草。鄂东南、江汉平原麦区应特别注意清沟防渍。6.适时收获，防止穗发芽。

适宜范围：适于湖北省小麦产区种植。

17.鄂麦 039(区试代号：鄂麦 229)

申请者：湖北省农业科学院粮食作物研究所

育种者：湖北省农业科学院粮食作物研究所、枣阳市农业技术推广中心

品种来源：周麦 18/川麦 55

品质产量：2023-2025 年度参加湖北省小麦科企创新测试联合体区域试验，品质经农业农村部谷物及制品质量检验检测中心（哈尔滨）测定，容重 790 克/升，粗蛋白含量（干基）14.37%，湿面筋含量 33.0%，吸水率 63.0%，稳定时间 4.0 分钟，最大拉伸阻力（Rm.135）176 EU，拉伸面积 48 平方厘米。两年区域试验平均亩产 466.10 公斤，比对照郑麦 9023 增产 11.92%。其中：2023-2024 年度亩产 424.98 公斤，比郑麦 9023 增产 13.31%；2024-2025 年度亩产 507.22 公斤，比郑麦 9023 增产 10.79%。2025-2026 年度生产试验平均亩产 424.36 公斤，比对照郑麦 9023 增产 9.78%。

特征特性：属偏春性品种。幼苗生长半直立，分蘖力强。株型中等，茎秆蜡质弱，穗下节间长度中等，旗叶短、上举。穗长度中等，穗长方形，小穗着生密度中等，长

芒，白壳，籽粒长圆形、白粒、中等大小、半角质。区域试验中株高 79.3 厘米，亩有效穗 35.1 万，每穗实粒数 38.3 粒，千粒重 40.9 克，生育期 193.0 天，比郑麦 9023 迟熟 0.4 天。抗病性鉴定为中感赤霉病和条锈病，高感白粉病和纹枯病。抗倒性较好。

栽培要点：1.适时播种。鄂北 10 月 23 日至 11 月 5 日播种，鄂东南和江汉平原 10 月 28 日至 11 月 10 日播种，亩基本苗 15-20 万。2.科学施肥。施足底肥，氮、磷、钾肥配合施用。全生育期一般亩施纯氮 10-12 公斤、五氧化二磷 6-8 公斤、氧化钾 4-6 公斤。3.注意清沟防渍，控旺促壮，防止倒伏。4.注意防治赤霉病、条锈病、白粉病、纹枯病等病害。5.适时收获，防止穗发芽。

适宜范围：适于湖北省小麦产区种植。

18.襄麦 239(区试代号：襄麦 2385)

申请者：襄阳市农业科学院

育种者：襄阳市农业科学院、襄阳市农业技术推广中心

品种来源：川农 16/川麦 49//鄂麦 19/扬麦 15

品质产量：2023-2025 年度参加湖北省小麦科企创新测试联合体区域试验，品质经农业农村部谷物及制品质量检验检测中心（哈尔滨）测定，容重 818 克/升，粗蛋白含量（干基）14.3%，湿面筋含量 29.8%，吸水率 52.8%，稳定时间 21.4 分钟，最大拉伸阻力（Rm.135）759 EU，拉伸面积 187 平方厘米。两年区域试验平均亩产 461.50 公斤，比对照郑麦 9023 增产 10.82%。其中：2023-2024 年度亩产 422.72 公斤，比郑麦 9023 增产 12.71%；2024-2025 年度亩产 500.28 公斤，比郑麦 9023 增产 9.27%。2025-2026 年度生产试验平均亩产 444.76 公斤，比对照郑麦 9023 增产 9.27%。

特征特性：属偏春性品种。幼苗生长半直立，分蘖较强。株型中等，茎秆蜡质轻，穗下节短，旗叶长度中等、下披，穗纺锤形，穗长度中等，穗层整齐度好，小穗着生密度中等，长芒、白壳，籽粒卵圆形、白粒、籽粒小、半角质。区域试验中株高 82.2 厘米，亩有效穗 34.6 万，每穗实粒数 43.6 粒，千粒重 38.0 克，生育期 193.5 天，比对照郑麦 9023 迟熟 0.9 天。抗病性鉴定为中感赤霉病，中抗白粉病，高感条锈和纹枯病。抗倒性一般。

栽培要点：1.适时播种。鄂北 10 月 25 日至 11 月 5 日播种，鄂东南和江汉平原 10 月 28 日至 11 月 10 日播种，亩基本苗 15-18 万。2.科学施肥。施足底肥，氮、磷、钾肥配合施用。全生育期一般亩施纯氮 11-13 公斤、五氧化二磷 6-8 公斤、氧化钾 4-6 公斤。3.注意清沟防渍，控旺促壮，防止倒伏。4.注意防治赤霉病、条锈病、白粉病、纹枯病等病害。5.适时收获，防止穗发芽。

适宜范围：适于湖北省小麦产区种植。

玉米

1. 恩单 2598（区试代号：恩单 2598）

申请者：恩施土家族苗族自治州农业科学院（硒应用技术与产品开发研究院）

育种者：恩施土家族苗族自治州农业科学院（硒应用技术与产品开发研究院）、湖北农发种业集团有限公司、湖北农垦联丰张集农业开发有限公司

品种来源：YJ31321×BE119

品质产量：2024-2025年参加湖北省山区玉米组品种区域试验，品质经农业农村部食品质量检验检测中心（武汉）测定，容重720克/升，粗蛋白（干基）含量9.4%，粗脂肪（干基）含量4.0%，粗淀粉（干基）含量75.1%。两年区域试验平均亩产704.52公斤，比对照华玉11增产10.22%。其中：2024年平均亩产712.36公斤，比对照华玉11增产12.37%；2025年平均亩产696.67公斤，比对照华玉11增产8.10%。2025年生产试验平均亩产709.60公斤，比对照华玉11增产8.90%。

特征特性：株型半紧凑，株高、穗位适中。幼苗叶鞘浅紫色，成株叶片数21片左右，穗上叶6-7片，雄穗分枝数10-15个，花药浅紫色，花丝红色。果穗筒形，苞叶包被较好，穗轴白色，籽粒黄色、马齿型。区域试验中株高327厘米，穗位高146厘米，空秆率0.8%，果穗长19.5厘米，果穗粗5.8厘米，秃尖长0.9厘米，穗行数17.1，行粒数38.1，百粒重38.8克，干穗出籽率83.6%，生育期131.5天，比对照华玉11长2.2天。田间大斑病3级，小斑病3级，灰斑病3级，锈病3级，白斑病3级，穗腐病3级，茎腐病病株率0.6%，纹枯病9级病株率0.7%。田间倒伏（折）率0.7%。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。3月下旬至4月中旬播种，单作每亩种植2800-3300株。2.科学施肥。施足底肥，早施苗肥，重施穗肥。3.加强田间管理。注意蹲苗，适时中耕除草，培土保墒，抗旱排渍，预防倒伏。4.防治病虫害。注意防治纹枯病、茎腐病以及地老虎、草地贪夜蛾、粘虫、玉米螟等病虫害。

适宜范围：适于湖北省恩施州、十堰市、神农架林区、宜昌市（枝江市和当阳市除外）、襄阳市的保康县、南漳县、谷城县等海拔1200米以下地区作春玉米种植。

2. 宜单 387（区试代号：宜单 387）

申请者：宜昌市农业科学研究所

育种者：宜昌市农业科学研究所、湖北农华生物科技有限公司

品种来源：22D1917×N517

品质产量：2024-2025年参加湖北省山区玉米组品种区域试验，品质经农业农村部食品质量检验检测中心（武汉）测定，容重777克/升，粗蛋白（干基）含量10.3%，粗脂肪（干基）含量4.6%，粗淀粉（干基）含量73.5%。两年区域试验平均亩产736.67

公斤，比对照华玉 11 增产 12.16%，其中：2024 年平均亩产 725.56 公斤，比对照华玉 11 增产 12.30%。2025 年平均亩产 747.78 公斤，比对照华玉 11 增产 12.03%。2025 年生产试验平均亩产 769.67 公斤，比对照华玉 11 增产 7.76%。

特征特性：株型半紧凑，株高、穗位适中。幼苗叶鞘紫色，成株叶片数 20 片左右，穗上叶 5-6 片，雄穗分枝数 5-7 个，花药浅红色，花丝绿色。果穗筒形，穗轴红色，籽粒黄色、半马齿型。区域试验中株高 327 厘米，穗位高 134 厘米，空秆率 0.6%，果穗长 19.8 厘米，果穗粗 5.5 厘米，秃尖长 0.6 厘米，穗行数 17.2，行粒数 38.5，百粒重 39.6 克，干穗出籽率 86.5%，生育期 132.0 天，比对照华玉 11 长 2.6 天。田间大斑病 3 级，小斑病 3 级，灰斑病 3 级，锈病 3 级，白斑病 3 级，穗腐病 3 级，茎腐病病株率 0.2%，纹枯病 9 级病株率 0.8%。田间倒伏（折）率 0.0%。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。3 月下旬至 4 月上旬播种，单作每亩种植 3000-3500 株。2.科学施肥。施足底肥，早施苗肥，追施拔节肥，重施穗肥。3.加强田间管理。注意蹲苗，适时中耕，抗旱排渍，喷施生长调节剂控制株高，预防倒伏。4.防治病虫害。注意防治茎腐病、锈病、纹枯病以及地老虎、草地贪夜蛾、粘虫、玉米螟等病虫害。

适宜范围：适于湖北省恩施州、十堰市、神农架林区、宜昌市（枝江市和当阳市除外）、襄阳市的保康县、南漳县、谷城县等海拔 1200 米以下地区作春玉米种植。

3.鄂科玉 11 号（区试代号：EKY2403）

申请者：湖北省农业科学院粮食作物研究所

育种者：湖北省农业科学院粮食作物研究所、湖北农发种业集团有限公司、河南农业大学、襄阳市农业科学院

品种来源：T1932×F223165

品质产量：2024-2025 年参加湖北省夏玉米组品种区域试验，品质经农业农村部食品质量检验检测中心（武汉）测定，容重 800 克/升，粗蛋白（干基）含量 11.4%，粗脂肪（干基）含量 4.3%，粗淀粉（干基）含量 75.2%。两年区域试验平均亩产 515.65 公斤，比对照汉单 777 增产 11.54%，其中：2024 年平均亩产 557.05 公斤，比对照汉单 777 增产 16.85%；2025 年平均亩产 474.25 公斤，比对照汉单 777 增产 5.89%。2025 年生产试验平均亩产 517.55 公斤，比对照汉单 777 增产 10.43%。

特征特性：株型半紧凑，株高、穗位适中，幼苗叶鞘紫色，成株叶片数 18 片左右，穗上叶 5-6 片，雄穗分枝数 8-10 个，花药淡黄色，花丝浅紫色。果穗筒形，苞叶包被较好，穗轴白色，籽粒黄色、硬粒型。区域试验中株高 222 厘米，穗位高 86 厘米，空秆率 1.0%，果穗长 15.8 厘米、果穗粗 4.5 厘米，秃尖长 0.6 厘米，穗行数 16.3，行粒数 31.6，百粒重 26.5 克，干穗出籽率 79.1%，生育期 91.3 天，比汉单 777 短 0.6

天。田间大斑病 3 级，小斑病 3 级，灰斑病 1 级，锈病 1 级，白斑病 1 级，穗腐病 3 级，茎腐病病株率 4.2%，纹枯病 9 级病株率 0.1%。耐高温能力较好。田间倒伏（折）率 3.0%。

栽培要点：（1）适时播种：5 月下旬至 6 月上旬播种。（2）播种密度：适宜播种密度范围为 4000-4500 株/亩。（3）施肥：底肥每亩施用复合肥 50 公斤；苗肥 4-5 片可见叶时施入，亩施尿素 10 公斤；穗肥 10-12 片可见叶时施入，亩施尿素 20 公斤。（4）加强田间管理：苗期防止田间积水，生长期确保水分充足，结合追肥进行两次中耕除草。（5）注意防治病虫害：注意防治地老虎、玉米螟等虫害。（6）适时收获：全田 90% 以上植株达到以下 3 项生理成熟指标时就可以收获：A. 苞叶完全枯黄、发白并松开；B. 果穗中下部籽粒乳线消失；C. 果穗中下部籽粒的基部与穗轴的连接处出现“黑色层”。

适宜范围：适于湖北省丘陵、平原地区作夏玉米种植。

4. 福玉 869（区试代号：福玉 7393）

申请者：武汉隆福康农业发展有限公司

育种者：武汉隆福康农业发展有限公司

品种来源：M7393F×F7337K

品质产量：2024-2025 年参加湖北省夏玉米组品种区域试验，品质经农业农村部食品质量检验检测中心（武汉）测定，容重 789 克/升，粗蛋白（干基）10.7%，粗淀粉（干基）74.0%，粗脂肪（干基）3.6%。两年区域试验平均亩产 502.85 公斤，比对照汉单 777 增产 9.10%，其中：2024 年平均亩产 520.53 公斤，比对照汉单 777 增产 9.86%；2025 年平均亩产 485.16 公斤，比对照汉单 777 增产 8.33%。2025 年生产试验平均亩产 534.10 公斤，比对照汉单 777 增产 9.62%。

特征特性：株型半紧凑，植株、穗位适中，幼苗叶鞘紫色，成株叶片数 18 片左右，穗上叶 5-6 片，雄穗分枝数 7-9 个，花药黄色，花丝浅紫色。果穗筒形，苞叶包被较好，穗轴白色，籽粒黄色、硬粒型。区域试验中株高 219 厘米，穗位高 83 厘米，空秆率 1.6%，果穗长 15.7 厘米，果穗粗 4.4 厘米，秃尖长 0.3 厘米，穗行数 17.4，行粒数 31.3，百粒重 24.7 克，干穗出籽率 86.2%，生育期 92.9 天，与对照汉单 777 相当。田间大斑病 3 级，小斑病 3 级，锈病 3 级，灰斑病 1 级，白斑病 1 级，穗腐病 3 级，茎腐病病株率 2.3%；纹枯病 9 级病株率 0.0%。耐高温能力较好。田间倒伏（折）率 0.8%。

栽培要点：1. 适时播种。5 月下旬至 6 月上旬播种。2. 合理密植。单作每亩种植 4500-5000 株。3. 科学施肥。底肥亩施复合肥 40 公斤，11-12 片叶时追施穗肥，亩施尿素 20-30 公斤。4. 加强田间管理。注意蹲苗，适时中耕培土，抗旱排渍。5. 防治病虫害

。注意防治纹枯病、茎腐病、锈病、黑粉病以及地老虎、玉米螟、草地贪夜蛾等病虫害。6.适时收获。

适宜范围：适于湖北省丘陵、平原地区作夏玉米种植。

5.堰青贮 1 号（区试代号：SY2405）

申请者：十堰市农业科学院

育种者：十堰市农业科学院、恩施土家族苗族自治州农业科学院（硒应用技术与产品开发研究院）

品种来源：F22×EH125

品质产量：2024-2025 年参加湖北省青贮玉米组品种区域试验，品质经北京农学院植物科学技术学院测定，淀粉含量 33.0%，中性洗涤纤维含量 37.5%，酸性洗涤纤维含量 19.1%，粗蛋白质含量 7.5%。两年区域试验鲜重平均亩产 3479.49 公斤，比对照雅玉青贮 8 号增产 9.88%，干重平均亩产 1331.34 公斤，比对照雅玉青贮 8 号增产 12.94%。其中：2024 年鲜重平均亩产 3290.83 公斤，比对照雅玉青贮 8 号增产 7.84%，干重平均亩产 1279.98 公斤，比对照雅玉青贮 8 号增产 13.21%；2025 年鲜重平均亩产 3668.15 公斤，比对照雅玉青贮 8 号增产 11.78%，干重平均亩产 1382.70 公斤，比对照雅玉青贮 8 号增产 12.69%。2025 年生产试验，鲜重平均亩产 3681.72 公斤，比对照雅玉青贮 8 号增产 10.7%，干重平均亩产 1375.70 公斤，比对照雅玉青贮 8 号增产 11.3%。

特征特性：株型半紧凑，田间长势强，株高、穗位略高。幼苗叶鞘浅紫色，收获时绿叶数 12 片左右，雄穗分枝数 11-13 个，花药紫色，花丝红色。果穗筒形，苞叶包被较好，穗轴红色，籽粒黄色、半马齿型。区域试验中株高 315 厘米，穗位高 140 厘米，空秆率 2.6%，鲜穗占比 33.6%，干物质率 39.5%，生育期 102.0 天，比对照雅玉青贮 8 号长 2.0 天。田间大斑病 3 级，小斑病 3 级，锈病 3 级，灰斑病 1 级，白斑病 1 级，穗腐病 3 级，茎腐病病株率为 0.8%，纹枯病 9 级病株率为 0.2%。田间倒伏（折）率 3.0%。

栽培要点：1.适时播种。露地直播于 3 月底至 4 月上中旬播种。2.合理密植。单作每亩种植 4000-4500 株。3.科学施肥。施足底肥，亩施复合肥 40-50 公斤。合理追肥，4-5 片叶时亩施尿素 7-10 公斤作苗肥，10-12 片叶时亩施尿素 13-20 公斤作穗肥。4.加强田间管理。注意蹲苗，中耕除草，培土雍蔸，抗旱排渍，防止倒伏。5.注意防治纹枯病、茎腐病、穗腐病、地老虎、草地贪夜蛾和玉米螟等病虫害。6.适时收获。当玉米籽粒乳线处于 1/2-2/3 时适时收获。

适宜范围：适于湖北省丘陵、平原地区作青贮玉米春播种植。

6.恩泽 298（区试代号：恩泽 298）

申请者：湖北泽隆农业科技有限公司

育种者：湖北泽隆农业科技有限公司、恩施土家族苗族自治州农业科学院（硒应用技术与产品开发研究院）

品种来源：（12FW07×112FW13）×BE119

品质产量：2024-2025 年参加鄂西南玉米品种区域试验，品质经农业农村部谷物品质检验测试中心测定，容重 768 克/升，粗蛋白（干基）9.69%，粗脂肪（干基）4.14%，粗淀粉（干基）72.00%。两年区域试验平均亩产 656.29 公斤，比对照华玉 11 增产 9.50%。其中：2024 年平均亩产 639.76 公斤，比对照华玉 11 增产 9.20%；2025 年平均亩产 672.81 公斤，比对照华玉 11 增产 9.79%。2025 年生产试验平均亩产 686.46 公斤，比对照华玉 11 增产 11.05%。

特征特性：株型半紧凑，株高、穗位适中。幼苗叶鞘浅紫色，成株叶片数 21-22 片，穗上叶 6-7 片，雄花一级分枝数 11-14 个，颖片基部深紫色，颖壳浅紫色，花药淡紫色，花丝浅红色。果穗锥形，苞叶包被完整，穗轴白色，籽粒黄色、马齿型。区域试验中株高 317 厘米，穗位高 139 厘米，空秆率 0.9%，果穗长 18.9 厘米，穗粗 6.0 厘米，秃尖长 0.4 厘米，穗行数 18.0，行粒数 36.6，百粒重 36.4 克，干穗出籽率 85.8%，生育期 134.7 天，与对照华玉 11 相当。田间大斑病 3 级，小斑病 1 级，灰斑病 3 级，锈病 3 级，白斑病 5 级，穗腐病 1 级，茎腐病病株率 0.0%，纹枯病 9 级病株率 2.1%。田间倒伏（折）率 0.9%。

栽培要点：1.适期播种。低山地区 3 月中下旬播种，二高山地区 4 月上中旬播种，育苗移栽和地膜覆盖栽培可提早 7-10 天播种，确保苗齐、苗全、苗壮。2.合理密植。单作种植密度 3000 株/亩，套作种植密度 2600 株/亩为宜。3.科学施肥。施足基肥，亩施 45%复合肥（25-10-10）40-50 公斤，增施有机肥和锌硼肥；轻施苗肥，6 叶时亩追施尿素 10 公斤；重施穗肥，12 叶时亩追施尿素 15 公斤。4.综合防治病虫害。综合防控白斑病、弯孢菌叶斑病以及地老虎、弯刺黑蜻、草地贪夜蛾、玉米螟、蚜虫等病虫害。5.加强田间管理。结合追肥进行中耕除草、培土保墒，及时抗旱排渍，预防倒伏。6.及时收获。苞叶变黄、籽粒变硬、乳线消失、基部黑色层形成时，抢收脱粒干燥。

适宜范围：适于湖北省恩施州以及宜昌市鄂西南海拔 1200 米以下地区作春玉米种植。

7.银谷 111（区试代号：KN23036）

申请者：湖北康农种业股份有限公司

育种者：湖北康农种业股份有限公司、华中农业大学

品种来源：FLA244738×FLA244740

品质产量：2023-2024 年参加湖北康农种业股份有限公司绿色通道山区玉米组品种区域试验，品质经农业农村部谷物品质检验测试中心测定，容重 746 克/升，粗蛋白（干基）10.03%，粗脂肪（干基）4.66%，粗淀粉（干基）70.51%。两年区域试验平均亩产 643.87 公斤，比对照华玉 11 增产 5.49%。其中：2023 年平均亩产 678.70 公斤，比对照华玉 11 增产 5.20%；2024 年平均亩产 609.03 公斤，比对照华玉 11 增产 5.85%。2024 年生产试验平均亩产 640.51 公斤，比对照华玉 11 增产 9.18%。

特征特性：株型半紧凑，株高、穗位偏高。幼苗叶鞘浅紫色，成株叶片数 19 片左右，穗上叶 6-8 片，雄穗分枝数 13-18 个，花药浅紫色，花丝浅紫色，果穗筒形，苞叶完整，穗轴白色，籽粒黄白色、马齿型。区域试验中株高 314cm，穗位高 143cm，空秆率 0.2%，果穗长 18.0 厘米，果穗粗 5.8 厘米，秃尖长 0.8 厘米，穗行数 18.1，行粒数 34.6，百粒重 33.6 克，干穗出籽率 84.3%，生育期 130.7 天，比对照华玉 11 长 0.6 天。田间大斑病 3 级，小斑病 3 级，锈病 3 级，灰斑病 3 级，白斑病 3 级，穗腐病 3 级，茎腐病病株率 1.3%，纹枯病 9 级病株率 0.5%。田间倒伏（折）率 1.5%。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。3 月下旬至 4 月上中旬播种，单作每亩种植 3300 株左右。2.科学用肥。底肥施用平衡型复合肥 40 公斤/亩，苗肥施用尿素 10 公斤/亩，拔节肥施用尿素 20 公斤/亩。3.加强田间管理。注意蹲苗，适时中耕除草，抗旱排渍，预防倒伏。4.防治病虫害。注意防治茎腐病以及地老虎、草地贪夜蛾、粘虫、玉米螟等病虫害。5.籽粒黑色层出现时收获，及时晾晒归仓。

适宜范围：适于湖北省恩施州，十堰市，神农架林区，宜昌市（枝江市和当阳市除外），襄阳市的保康县、南漳县、谷城县等海拔 1200 米以下地区作春玉米种植。

8.宏运 103（区试代号：宏运 103）

申请者：湖北惠民农业科技有限公司

育种者：湖北惠民农业科技有限公司

品种来源：22HMS153×FAN01

品质产量：2023-2024 年参加湖北省奥兴联合体丘陵平原玉米组品种区域试验，品质经农业农村部食品质量检验测试中心（武汉）测定，容重 750 克/升，粗蛋白质（干基）10.10%，粗脂肪（干基）4.40%，粗淀粉（干基）74.80%。两年区域试验平均亩产 671.58 公斤，比对照宜单 629 增产 10.68%，其中：2023 年平均亩产 714.93 公斤，比对照宜单 629 增产 11.94%；2024 年平均亩产 628.23 公斤，比对照宜单 629 增产 9.29%。2025 年生产试验，平均亩产 634.11 公斤，比对照宜单 629 增产 10.80%。

特征特性：株型半紧凑，植株、穗位较高，幼苗叶鞘紫色，成株叶片数 18 片左右，穗上叶 6-7 片，雄穗分枝数 5-7 个，花药黄色，花丝紫色。果穗筒形，苞叶包被好，穗轴红色，籽粒黄色、半马齿型。区域试验中株高 300 厘米，穗位高 118 厘米，空秆率 0.4%，果穗

长 17.4 厘米、果穗粗 4.8 厘米，秃尖长 1.0 厘米，穗行数 17.5，行粒数 37.2，百粒重 30.7 克，干穗出籽率 88.7%，生育期 106.7 天，比对照宜单 629 短 1.2 天。田间大斑病 3 级，小斑病 5 级，灰斑病 3 级，锈病 5 级，白斑病 3 级，穗腐病 3 级，茎腐病病株率 2.7%，纹枯病 9 级病株率 0.0%。田间倒伏（折）率 2.7%。

栽培要点：1.适时播种。4 月上中旬播种。2.合理密植。单作每亩种植 4000-4500 株。3.科学施肥。施足底肥，亩施复合肥 20-30 公斤；重施穗肥，大喇叭口期亩施尿素 20-30 公斤。4.加强田间管理。及时防除杂草，播种后及时喷施封闭除草剂，并用玉米专用除草剂防除杂草，及时抗旱排涝。5.注意防治地老虎、草地贪夜蛾、玉米螟、蚜虫等虫害。6.适时收获。

适宜范围：适于湖北省丘陵、平原地区作春玉米种植。

9.金玉汇 211（区试代号：金玉汇 211）

申请者：湖北金玉汇种业科技有限公司

育种者：湖北金玉汇种业科技有限公司、广西壮族自治区农业科学院

品种来源：GD31×ZNC442

品质产量：2023-2024 年参加湖北金玉汇企业联合体山区玉米品种区域试验，品质经农业农村部谷物品质检验测试中心测定，容重 728 克/升，粗蛋白（干基）9.15%，粗脂肪（干基）4.16%，粗淀粉（干基）73.48%。两年区域试验平均亩产 729.68 公斤，比对照华玉 11 增产 8.18%。其中：2023 年平均亩产 732.00 公斤，比对照华玉 11 增产 7.81%；2024 年平均亩产 727.37 公斤，比对照华玉 11 增产 8.56%。2024 年生产试验平均亩产 694.17 公斤，比对照华玉 11 增产 9.48%。

特征特性：株型半紧凑，株高、穗位适中。幼苗叶鞘紫色，成株叶片数 21 片左右，穗上叶 7 片，雄穗分枝数 11-15 个，花药浅红色，花丝浅红色。果穗筒形，苞叶包被较好，穗轴红色，籽粒黄色、马齿型。区域试验中株高 305 厘米，穗位高 119 厘米，空秆率 0.0%，果穗长 21.2 厘米，果穗粗 5.7 厘米，秃尖长 0.7 厘米，穗行数 17.3，行粒数 40.7，百粒重 33.5 克，出籽率 83.5%，生育期 141.5 天，比对照华玉 11 短 0.9 天。田间大斑病 3 级，小斑病 3 级，锈病 3 级，灰斑病 3 级，白斑病 3 级，穗腐病 3 级，茎腐病病株率 0.4%，纹枯病 9 级病株率 0.3%。田间倒伏（折）率 0.0%。

栽培要点：1.适时播种。3 月中旬至 4 月上旬播种，育苗移栽和地膜覆盖栽培可提早 7-10 天播种。2.合理密植。单作每亩种植 3000 株左右。3.科学施肥。施足底肥，每亩施复合肥 40-50 公斤；适施苗肥，4-5 叶时每亩施尿素 8-10 公斤；重施穗肥，大喇叭口期每亩施尿素 20-30 公斤。4.加强田间管理。适时中耕培土，抗旱排渍，预防倒伏。5.防治病虫害。注意防治纹枯病、茎腐病、穗腐病、弯孢菌叶斑病、地老虎、弯刺黑蜻、草地贪夜蛾、玉米螟等病虫害。6.适时收获。全田果穗苞叶变黄、籽粒基

部出现黑色层时为最佳采收期，适时抢收抢晒，防止籽粒霉变。

适宜范围：适于湖北省恩施州、十堰市、神农架林区、宜昌市（枝江市和当阳市除外）、襄阳市的保康县、南漳县、谷城县等海拔 1200 米以下地区作春玉米种植。

10. 华玉32（区试代号：HZX2302）

申请者：华中农业大学、湖北洪山实验室

育种者：华中农业大学、湖北洪山实验室

品种来源：MND6×LNY59

品质产量：2023-2024年参加湖北省夏播玉米长江科企联合体夏玉米品种区域试验，品质经农业农村部食品质量检验检测中心（武汉）测定，容重764克/升，粗蛋白（干基）含量11.30%，粗脂肪（干基）含量4.60%，粗淀粉（干基）含量75.50%。两年区域试验平均亩产519.27公斤，比对照汉单777增产6.00%。其中：2023年平均亩产558.60公斤，比对照汉单777增产3.93%；2024年平均亩产479.94公斤，比对照汉单777增产8.51%。2024年生产试验平均亩产489.70公斤，比对照汉单777增产6.10%。

特征特性：株型半紧凑，株高、穗位略高。幼苗叶鞘浅紫色，成株叶片数19片左右，穗上叶6-7片，雄穗分枝数12-14个，花药浅紫色，花丝浅紫色。果穗锥形，苞叶包被较好，穗轴白色，籽粒黄色、半马齿型。区域试验中株高249厘米，穗位高113厘米，空秆率0.8%，果穗长16.8厘米，果穗粗4.5厘米，秃尖长0.8厘米，穗行数14.2，行粒数31.4，百粒重31.0克，出籽率84.8%，生育期100.3天，与对照汉单777相当。田间大斑病3级，小斑病3级，灰斑病1级，锈病3级，白斑病3级，穗腐病3级，茎腐病病株率0.1%，纹枯病9级病株率0.0%。耐高温能力较好。田间倒伏（折）率2.4%。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。5月下旬至6月初播种，单作每亩种植4500株。2.科学施肥。施足底肥，亩施复合肥40公斤；早施苗肥，亩施尿素10公斤；重施穗肥，大喇叭口期亩施尿素25-30公斤。3.加强田间管理。注意蹲苗，适时中耕，抗旱排渍。4.防治病虫害。注意防治茎腐病以及地老虎、草地贪夜蛾、粘虫、玉米螟等病虫害。5.适时收获。待籽粒乳线消失，选择连续晴好天气，及时收获、晾晒、脱粒。

适宜范围：适于湖北省丘陵、平原地区作夏玉米种植。

11. 汉玉2026（区试代号：汉单587）

申请者：湖北华丰瑞农业科技有限公司、湖北省种子集团有限公司

育种者：湖北华丰瑞农业科技有限公司、湖北省种子集团有限公司

品种来源：H220274×H222474

品质产量：2024-2025年参加湖北省夏播玉米长江科企联合体夏玉米品种区域试验，品质经农业农村部食品质量检验检测中心（武汉）测定，容重747克/升，粗蛋白（干基）含量10.00%，粗脂肪（干基）含量3.00%，粗淀粉（干基）含量71.10%。两

年区域试验平均亩产544.12公斤，比对照汉单777增产15.25%。其中：2024年平均亩产530.11公斤，比对照汉单777增产19.85%；2025年平均亩产558.14公斤，比对照汉单777增产11.19%。2025年生产试验平均亩产511.1公斤，比对照汉单777增产7.40%。

特征特性：株型半紧凑，株高、穗位适中。幼苗叶鞘紫色，成株叶片数19片左右，穗上叶5-7片，雄穗分枝数6-9个，花药浅紫色，花丝紫色。果穗筒形，苞叶包被较好，穗轴红色，籽粒黄色、半马齿型。区域试验中株高244厘米，穗位高102厘米，空秆率1.2%，果穗长17.6厘米，果穗粗4.7厘米，秃尖长0.7厘米，穗行数14.6，行粒数32.5，百粒重30.9克，干穗出籽率87.0%，生育期97.4天，比对照汉单777长1.1天。田间大斑病5级，小斑病5级，灰斑病1级，锈病3级，白斑病3级，穗腐病5级，茎腐病病株率0.5%，纹枯病9级病株率0.0%。耐高温能力较好。田间倒伏（折）率0.4%。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。5月下旬至6月上旬播种，单作每亩种植4500株。2.科学施肥。施足底肥，亩施复合肥40公斤；早施苗肥，亩施尿素10公斤；重施穗肥，大喇叭口期亩施尿素25-30公斤。3.加强田间管理。注意蹲苗，适时中耕，抗旱排渍。4.防治病虫害。注意防治茎腐病以及地老虎、草地贪夜蛾、粘虫、玉米螟等病虫害。5.适时收获。待籽粒乳线消失，选择连续晴好天气，及时收获、晾晒、脱粒。

适宜范围：适于湖北省丘陵、平原地区作夏玉米种植。

12.黑甜糯 928（区试代号：尚黑糯 1 号）

申请者：海南金玉汇南繁科技有限公司

育种者：海南金玉汇南繁科技有限公司、四川美玉农业科技有限公司

品种来源：HT2-1×HT3-4

品质产量：2021-2022年参加湖北省金玉汇自主鲜食玉米品种区域试验，品质经扬州大学农学院测定，皮渣率11.27%，支链淀粉占总淀粉97.39%。鲜果穗外观品质和蒸煮品质综合评分87.8分。两年区域试验商品穗平均亩产868.91公斤，比对照粤甜16号增产1.96%。其中：2021年商品穗平均亩产820.51公斤，比对照粤甜16号增产3.05%；2022年商品穗平均亩产917.31公斤，比对照粤甜16号增产1.01%。2024年生产试验商品穗平均亩产833.86公斤，比对照粤甜16号增产2.18%。

特征特性：株型半紧凑，株高适中，穗位偏低。幼苗叶鞘紫色，成株叶片数19片左右，穗上叶5片左右。雄穗分枝数11-14个，花药浅紫色，花丝紫色。果穗筒形，苞叶包被较好，穗轴紫色，籽粒紫色，甜糯类型（甜粒:糯粒约为1:3）。区域试验中株高207厘米，穗位高72厘米，空秆率0.5%，果穗长19.9厘米，果穗粗4.6厘米，秃尖长0.9厘米，穗行数13.5，行粒数36.5，百粒重35.1克，生育期86.1天，比对照粤甜16号短3.3天。田间大斑病1级，小斑病3级，灰斑病3级，锈病1级，穗腐病1级，茎腐病病株率0.0%，纹枯病9级病株率0.0%。田间倒伏（折）率0.0%。

栽培要点：1.隔离种植。与其他玉米品种空间隔离500米以上，花期时间隔离不少于30天。2.适时播种，合理密植。地膜覆盖栽培或育苗移栽于3月上旬播种，露地直播于3月下旬或4月上旬播种，每亩种植密度3000株左右。3.科学施肥。施足底肥，早施苗肥，重施穗肥。4.加强田间管理。注意蹲苗，适时中耕，抗旱排渍，防止倒伏。5.防治病虫害。注意防治小斑病以及地老虎、玉米螟等病虫害。6.适时收获。一般授粉后20-25天采收。

适宜范围：适于湖北省海拔1200米以下地区春播种植。

13.金银3号（区试代号：金银3号）

申请者：湖北省农业科学院粮食作物研究所

育种者：湖北省农业科学院粮食作物研究所

品种来源：雪759×HES6

品质产量：2024-2025年参加湖北省鲜食玉米特殊类型区域试验，品质经扬州大学农学院测定，皮渣率8.15%，水溶性总糖含量15.44%，还原糖含量2.03%。鲜果穗外观品质和蒸煮品质综合评分90.7分。两年区域试验商品穗平均亩产910.87公斤，比对照粤甜16号增产9.23%，其中：2024年商品穗平均亩产967.70公斤，比粤甜16号增产9.08%；2025年商品穗平均亩产854.04公斤，比粤甜16号增产9.40%。2025年生产试验商品穗平均亩产853.6公斤，比对照粤甜16号增产5.80%。

特征特性：株型半紧凑，株高适中、穗位偏低。幼苗叶鞘浅紫色，成株叶片数18-19片，穗上叶5-6片，雄穗分枝数12-16个，花药浅紫色，花丝绿色。果穗筒形，苞叶包被较好，穗轴白色，籽粒黄白色。区域试验中株高208厘米，穗位高72厘米，空秆率1.5%，果穗长19.8厘米，果穗粗5.1厘米，秃尖长0.8厘米，穗行数16.5，行粒数38.6，百粒重37.5克，生育期77.4天，比对照粤甜16号短2.8天。田间大斑病3级，小斑病3级，灰斑病1级，锈病3级，白斑病1级，穗腐病3级，茎腐病病株率0.1%，纹枯病9级病株率0.0%。田间倒伏（折）率为0.5%。

栽培要点：1.隔离种植。与其他玉米品种空间隔离500米以上，花期时间隔离不少于30天。2.适时播种，合理密植。地膜覆盖栽培或育苗移栽于3月上中旬播种，露地直播于3月下旬至4月上旬播种，每亩田间种植密度2800-3500株。3.科学施肥。施足底肥，早施苗肥，重施穗肥。4.加强田间管理。注意蹲苗，适时中耕，抗旱排渍，预防倒伏。5.防治病虫害。注意防治纹枯病、茎腐病以及地老虎、草地贪夜蛾、粘虫、玉米螟等病虫害。6.适时采收，一般吐丝授粉后20-23天采收。

适宜范围：适于湖北省丘陵、平原地区春播种植。

14.鄂科甜5号（区试代号：鄂科甜5号）

申请者：湖北省农业科学院粮食作物研究所

育种者：湖北省农业科学院粮食作物研究所

品种来源：ST1503×HES6

品质产量：2024-2025年参加湖北省鲜食玉米特殊类型区域试验，品质经扬州大学农学院测定，皮渣率9.18%，水溶性总糖含量20.62%，还原糖含量1.95%。鲜果穗外观品质和蒸煮品质综合评分87.8分。两年区域试验商品穗平均亩产939.02公斤，比对照粤甜16号增产13.21%，其中：2024年商品穗亩产1048.25公斤，比粤甜16号增产19.36%；2025年商品穗亩产829.78公斤，比粤甜16号增产6.29%。2025年生产试验，商品穗平均亩产893.5公斤，比对照粤甜16号增产10.80%。

特征特性：株型半紧凑，株高、穗位适中。幼苗叶鞘绿色，成株叶片数18-19片，穗上叶5-6片，雄穗分枝数14-18个，花药黄色，花丝绿色。果穗筒形，苞叶包被较好，穗轴白色，籽粒黄色。区域试验中株高228厘米，穗位高95厘米，空秆率1.7%，果穗长20.2厘米，果穗粗5.4厘米，秃尖长1.0厘米，穗行数15.9，行粒数39.3，百粒重41.7克，生育期83.1天，比对照粤甜16号长2.9天。田间大斑病3级，小斑病3级，灰斑病1级，锈病1级，白斑病1级，穗腐病1级，茎腐病病株率0.2%，纹枯病9级病株率0.0%。田间倒伏（折）率为1.2%。

栽培要点：1.隔离种植。与其他玉米品种空间隔离 500 米以上，花期时间隔离不少于 30 天。2.适时播种，合理密植。地膜覆盖栽培或育苗移栽于 3 月上中旬播种，露地直播于 3 月下旬至 4 月上旬播种，每亩田间种植密度 2800-3500 株。3.科学施肥。施足底肥，早施苗肥，重施穗肥。4.加强田间管理。注意蹲苗，适时中耕，抗旱排渍，预防倒伏。5.防治病虫害。注意防治纹枯病、茎腐病以及地老虎、草地贪夜蛾、粘虫、玉米螟等病虫害。6.适时采收，一般吐丝授粉后 21-23 天采收。

适宜范围：适于湖北省丘陵、平原地区春播种植。

大豆

1.辽鲜豆 17（区试代号：辽鲜豆 17）

申请者：辽宁省农业科学院作物研究所

育种者：辽宁省农业科学院作物研究所

品种来源：辽 00126/Seakygangputkong

品质产量：2023-2024 年参加湖北省鲜食春大豆品种区域试验，两年区试平均亩产 914.26 公斤，比对照交大 11 号增产 13.41%。其中：2023 年平均亩产 859.03 公斤，比对照交大 11 号增产 15.52%；2024 年平均亩产 969.49 公斤，比对照交大 11 号增产 11.60%。2025 年生产试验平均亩产 792.7 公斤，比对照交大 11 号增产 8.12%。经感

观品质鉴定标准二粒荚荚长 4.8 厘米，荚宽 1.3 厘米，每 500 克标准荚数 162 个，口感香甜柔糯（A 级）。

特征特性：属鲜食春大豆品种。株型收敛，株高 46.1cm 较低，有限结荚习性。叶椭圆形，花白色，茸毛灰色。鲜荚弯镰形、淡绿色。籽粒圆形，种皮淡绿色、子叶黄色，种脐淡褐色。区域试验中株高 46.1 厘米，主茎节数 9.2 个，分枝数 2.9 个，单株荚数 25.2 个，单株鲜荚重 59.8 克，百粒鲜重 67.6 克，出仁率 56.7%。从出苗至鲜荚采收 80.2 天。经病害鉴定，抗大豆花叶病毒病 3 号株系和 7 号株系，中感大豆炭疽病。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。3 月下旬到 4 月上旬播种，根据肥力一般亩保苗 1.67 万株。2.施足底肥，合理追肥。结合整地亩施底肥复合肥 15-25 公斤，花荚期视苗情亩追施尿素 5 公斤或增施叶面肥。3.加强田间管理。注意清沟排渍，及时中耕除草；结荚鼓粒期遇干旱及时灌溉。4.病虫害防治。注意防治根腐病和地老虎、蚜虫、斜纹夜蛾等病虫害。5.适时收获。绿色饱满豆荚达 80%时及时采收。

适宜范围：适宜在湖北省鲜食大豆种植区春播种植。

2.俊豆 22（区试代号：俊豆 22）

申请者：武汉弘耕种业有限公司、嘉祥县俊豪种业有限公司

育种者：武汉弘耕种业有限公司、嘉祥县俊豪种业有限公司

品种来源：徐豆 13 号/荷豆 20 号

品质产量：2023-2024 年参加湖北省春大豆品种区域试验，两年区试平均亩产 224.68 公斤，比对照油春 1204 增产 1.89%。其中：2023 年平均亩产 230.36 公斤，比对照油春 1204 增产 1.81%；2024 年平均亩产 219.00 公斤，比对照油春 1204 增产 1.99%。2025 年生产试验平均亩产 184.2 公斤，比对照油春 1204 增产 2.7%。品质经农业农村部谷物品质检验测试中心测定，含油量 21.67%，粗蛋白含量 45.53%。

特征特性：属高油春大豆品种。株型收敛，株高适中，茎秆直立，有限结荚习性。叶椭圆形，花紫色，茸毛棕色。成熟荚浅褐色。籽粒圆形，种皮黄色、子叶黄色，种脐褐色。区域试验中株高 46.4 厘米，主茎节数 10.3 个，分枝数 1.3 个，单株荚数 23.5 个，单株粒数 53.0 个，单株粒重 15.0 克，完全粒率 74.7%，百粒重 30.7 克。生育期 99.4 天，比对照油春 1204 晚 0.6 天。经病害鉴定，抗大豆花叶病毒病 3 号株系和 7 号株系。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。3 月中下旬至 4 月上旬播种，根据肥力一般亩保苗 1.67 万株。2.施足底肥，合理追肥。底肥亩施复合肥 30-40 公斤，花荚期视苗情亩施尿素 5 公斤或增施叶面肥。3.加强田间管理。注意清沟排渍，及时中耕除草；结荚鼓粒期遇干旱及时灌溉。4.病虫害防治。注意防治根腐病和地老虎、蚜虫、斜纹

夜蛾等病虫害。5.适时收获。

适宜范围：适于湖北省作春大豆种植。

3.中豆 122（区试代号：油春 20-03）

申请者：中国农业科学院油料作物研究所

育种者：中国农业科学院油料作物研究所

品种来源：天隆 2 号/中豆 43

品质产量：2023-2024 年参加湖北省春大豆品种区域试验，两年区试平均亩产 227.44 公斤，比对照油春 1204 增产 3.14%。其中：2023 年平均亩产 232.82 公斤，比对照油春 1204 增产 2.89%；2024 年平均亩产 222.06 公斤，比对照油春 1204 增产 3.41%。2025 年生产试验平均亩产 192.8 公斤，比对照油春 1204 增产 7.50%。品质经农业农村部谷物品质检验测试中心测定，含油量 20.96%，粗蛋白含量 43.25%。

特征特性：属春大豆品种。株型收敛，株高适中，茎秆直立，有限结荚习性。叶椭圆形，花白色，茸毛灰色。成熟荚灰褐色。籽粒椭圆形，种皮黄色、子叶黄色，种脐褐色。区域试验中株高 69.0 厘米，主茎节数 12.0 个，分枝数 3.0 个，单株荚数 29.2 个，单株粒数 64.5 个，单株粒重 16.1 克，完全粒率 88.4%，百粒重 25.2 克。生育期 99.6 天，比对照油春 1204 晚 0.8 天。经病害鉴定，中感大豆花叶病毒病 3 号株系和 7 号株系。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。3 月下旬-4 月上旬播种，根据肥力一般亩保苗 1.7 万株。2.施足底肥，合理追肥。底肥一般亩施复合肥 30 公斤，花荚期视苗情亩施尿素 5-10 公斤或增施叶面肥。3.加强田间管理。注意清沟排渍，及时中耕除草；花期视苗情适时化控，防止倒伏；结荚鼓粒期遇干旱及时灌溉。4.病虫害防治：注意防治花叶病、根腐病和地老虎、蚜虫、斜纹夜蛾等病虫害。5.适时收获。

适宜范围：适于湖北省作春大豆种植。

4.中豆 116（区试代号：油春 21-09）

申请者：中国农业科学院油料作物研究所

育种者：中国农业科学院油料作物研究所

品种来源：天隆一号/K 丰 74-3

品质产量：2023-2024 年参加湖北省春大豆品种区域试验，两年区试平均亩产 203.71 公斤，比对照湘春豆 26 增产 7.60%。其中：2023 年平均亩产 207.75 公斤，比对照湘春豆 26 增产 4.23%；2024 年平均亩产 199.66 公斤，比对照湘春豆 26 增产 11.35%。2025 年生产试验平均亩产 172.9 公斤，比对照湘春豆 26 增产 22.50%。品质经农业农村部谷物品质检验测试中心测定，含油量 19.87%，粗蛋白含量 46.03%。

特征特性：属高蛋白春大豆品种。株型收敛，株高适中，茎秆直立，有限结荚习

性。叶椭圆形，花白色，茸毛灰色。成熟荚褐色。籽粒椭圆形，种皮黄色、子叶黄色，种脐浅褐色。区域试验中株高 56.9 厘米，主茎节数 10.9 个，分枝数 2.8 个，单株荚数 29.1 个，单株粒数 54.0 个，单株粒重 12.7 克，完全粒率 94.9%，百粒重 23.2 克。生育期 91.5 天，比对照湘春豆 26 晚 6.6 天。经病害鉴定，中感大豆花叶病毒病 3 号株系，感大豆花叶病毒病 7 号株系。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。3 月下旬-4 月上旬播种，根据肥力一般亩保苗 2.1 万株。2.施足底肥，合理追肥。底肥一般亩施复合肥 30-40 公斤，花荚期视苗情亩施尿素 5-10 公斤或增施叶面肥。3.加强田间管理。注意清沟排渍，及时中耕除草；花期视苗情适时化控，防止倒伏；结荚鼓粒期遇干旱及时灌溉。4.病虫害防治：注意防治花叶病、根腐病和地老虎、蚜虫、斜纹夜蛾等病虫害。5.适时收获。

适宜范围：适于湖北省作春大豆种植。

5.中豆 124（区试代号：油春 1072）

申请者：中国农业科学院油料作物研究所

育种者：中国农业科学院油料作物研究所

品种来源：浙鲜豆 5 号/中豆 43

品质产量：2024-2025 年参加湖北省春大豆品种区域试验，两年区试平均亩产 209.37 公斤，比对照湘春豆 26 增产 30.71%。其中：2024 年平均亩产 211.28 公斤，比对照湘春豆 26 增产 17.83%；2025 年平均亩产 207.45 公斤，比对照湘春豆 26 增产 47.07%。2025 年生产试验平均亩产 177.5 公斤，比对照湘春豆 26 增产 25.70%。品质经农业农村部谷物品质检验测试中心测定，含油量 22.87%，粗蛋白含量 39.90%。

特征特性：属高油春大豆品种。株型收敛，株高适中，茎秆直立，有限结荚习性。叶长椭圆形，花白色，茸毛灰色。成熟荚褐色。籽粒椭圆形，种皮黄色、子叶黄色，种脐褐色。区域试验中株高 50.3 厘米，主茎节数 11.2 个，分枝数 2.4 个，单株荚数 29.5 个，单株粒数 62.2 个，单株粒重 14.5 克，完全粒率 92.0%，百粒重 24.1 克。生育期 90.8 天，比对照湘春豆 26 晚 5.4 天。经病害鉴定，中抗大豆花叶病毒病 3 号株系和 7 号株系。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。3 月下旬-4 月上中旬播种，根据肥力一般亩保苗 1.7 万株。2.施足底肥，合理追肥。底肥一般亩施复合肥 30 公斤，花荚期视苗情亩施尿素 5-10 公斤或增施叶面肥。3.加强田间管理。注意清沟排渍，及时中耕除草；花期视苗情适时化控，防止倒伏；结荚鼓粒期遇干旱及时灌溉。4.病虫害防治：注意防治根腐病和地老虎、蚜虫、斜纹夜蛾等病虫害。5.适时收获。

适宜范围：适于湖北省作春大豆种植。

6.中豆 81（区试代号：中豆 8101）

申请者：中国农业科学院油料作物研究所

育种者：中国农业科学院油料作物研究所

品种来源：中豆 57/中黄 13

品质产量：2024-2025 年参加湖北省夏大豆品种区域试验，两年区试平均亩产 210.36 公斤，比对照南农 66 增产 7.81%。其中：2024 年平均亩产 216.36 公斤，比对照南农 66 增产 3.91%；2025 年平均亩产 204.36 公斤，比对照南农 66 增产 11.71%。2025 年生产试验平均亩产 204.2 公斤，比对照南农 66 增产 16.75%。品质经农业农村部谷物品质检验测试中心测定，含油量 19.18%，粗蛋白含量 46.51%。

特征特性：属高蛋白夏大豆品种。株型收敛，株高适中，茎秆直立，有限结荚习性。叶椭圆形，花紫色，茸毛灰色。成熟荚黄色。籽粒圆形，种皮黄色、子叶黄色，种脐淡褐色。区域试验中株高 54.4 厘米，主茎节数 12.4 个，分枝数 2.1 个，单株荚数 39.0 个，单株粒数 86.2 个，单株粒重 17.8 克，完全粒率 90.0%，百粒重 22.3 克。生育期 100.3 天，比对照南农 66 晚 3.2 天。经病害鉴定，中抗大豆花叶病毒病 3 号株系和 7 号株系。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。5 月下旬至 6 月中旬播种，根据肥力一般亩保苗 1.67 万株。2.施足底肥，合理追肥。底肥一般亩施复合肥 30 公斤，花荚期视苗情亩施尿素 5-10 公斤或增施叶面肥。3.加强田间管理。注意清沟排渍，及时中耕除草；花期视苗情适时化控，防止倒伏；结荚鼓粒期遇干旱及时灌溉。4.病虫害防治：注意防治紫斑病、根腐病和地老虎、蚜虫、斜纹夜蛾等病虫害。5.适时收获。

适宜范围：适于湖北省作夏大豆种植。

7.冈黄 2 号（区试代号：冈黄 2 号）

申请者：黄冈市农业科学院

育种者：黄冈市农业科学院、湖北麦谷丰生物科技有限公司

品种来源：鄂豆 710/宜豆 268

品质产量：2024-2025 年参加湖北省夏大豆品种区域试验，两年区试平均亩产 221.77 公斤，比对照南农 66 增产 13.87%。其中：2024 年平均亩产 221.80 公斤，比对照南农 66 增产 6.52%；2025 年平均亩产 221.74 公斤，比对照南农 66 增产 21.22%。2025 年生产试验平均亩产 204.5 公斤，比对照南农 66 增产 16.92%。品质经农业农村部谷物品质检验测试中心测定，含油量 22.48%，粗蛋白含量 40.60%。

特征特性：属高油夏大豆品种。株型收敛，株高适中，茎秆直立，有限结荚习性。叶椭圆形，花色，茸毛灰色。成熟荚黄色。籽粒椭圆形，种皮黄色、子叶黄色，种脐浅黄色。区域试验中株高 51.3 厘米，主茎节数 11.9 个，分枝数 3.0 个，单株荚数 45.1 个，单株粒数 96.5 个，单株粒重 17.4 克，完全粒率 93.1%，百粒重 19.1 克。生育期

95.7 天，比对照南农 66 早 1.4 天。经病害鉴定，中抗大豆花叶病毒病 3 号株系和 7 号株系。

栽培要点: 1.适期播种。5 月下旬至 6 月中下旬播种。2.合理密植。每亩密度 1.33-2.0 万株。3.科学施肥。一般亩施底肥复合肥 20 公斤。可在苗期、花期根据田间长势，每亩追肥施复合肥 10 公斤或尿素 5 公斤，始花期和结荚初期可喷施叶面肥促进挂荚。4.控旺。花期视苗情适时化控，防止倒伏。5.病虫害防治。苗期注意防治蚜虫。中后期注意防治豆荚螟、大豆食心虫等。6.适时收获。

适宜范围: 适于湖北省作夏大豆种植。

8.冈黄 3 号（区试代号：冈黄 3 号）

申请者: 黄冈市农业科学院

育种者: 黄冈市农业科学院

品种来源: 诱处 4 号/枣阳猴毛豆

品质产量: 2024-2025 年参加湖北省夏大豆品种区域试验，两年区试平均亩产 205.57 公斤，比对照南农 66 增产 8.77%。其中：2024 年平均亩产 212.30 公斤，比对照南农 66 增产 8.84%；2025 年平均亩产 198.84 公斤，比对照南农 66 增产 8.70%。2025 年生产试验平均亩产 191.1 公斤，比对照南农 66 增产 9.26%。品质经农业农村部谷物品质检验测试中心测定，含油量 21.58%，粗蛋白含量 44.59%。

特征特性: 属夏大豆品种。株型收敛，株高适中，茎秆直立，有限结荚习性。叶椭圆形，花白色，茸毛灰色。成熟荚黄色。籽粒圆形，种皮黄色、子叶黄色，种脐淡褐色。区域试验中株高 56.4 厘米，主茎节数 12.2 个，分枝数 2.5 个，单株荚数 39.5 个，单株粒数 81.4 个，单株粒重 16.0 克，完全粒率 91.3%，百粒重 21.8 克。生育期 96.2 天，比对照南农 66 早 0.2 天。经病害鉴定，中感大豆花叶病毒病 3 号株系和 7 号株系。

栽培要点: 1.适期播种。5 月下旬至 6 月中下旬播种。2.合理密植。每亩密度 1.33-2.0 万株。3.科学施肥。一般亩施底肥复合肥 20 公斤。可在苗期、花期根据田间长势，每亩追肥施复合肥 10 公斤或尿素 5 公斤，始花期和结荚初期可喷施叶面肥促进挂荚。4.控旺。花期视苗情适时化控，防止倒伏。5.病虫害防治。苗期注意防治蚜虫。中后期注意防治豆荚螟、大豆食心虫等。6.适时收获。

适宜范围: 适于湖北省作夏大豆种植。

9.圣育 12（区试代号：圣育 12）

申请者: 武汉市武昌区望农种苗经营部、山东圣育种业科技有限公司

育种者: 武汉市武昌区望农种苗经营部、山东圣育种业科技有限公司

品种来源: 华豆 36/华豆 10 号

品质产量：2024-2025 年参加湖北省夏大豆品种区域试验，两年区试平均亩产 233.06 公斤，比对照南农 66 增产 19.16%。其中：2024 年平均亩产 248.51 公斤，比对照南农 66 增产 19.35%；2025 年平均亩产 217.61 公斤，比对照南农 66 增产 18.96%。2025 年生产试验平均亩产 204.7 公斤，比对照南农 66 增产 17.04%。品质经农业农村部谷物品质检验检测中心测定，含油量 21.70%，粗蛋白含量 45.29%。

特征特性：属高蛋白夏大豆品种。株型收敛，株高适中，茎秆直立，有限结荚习性。叶椭圆形，花白色，茸毛棕色。成熟荚浅褐色。籽粒圆形，种皮黄色、子叶黄色，种脐深褐色。区域试验中株高 55.8 厘米，主茎节数 12.9 个，分枝数 2.2 个，单株荚数 40.4 个，单株粒数 94.3 个，单株粒重 17.8 克，完全粒率 92.5%，百粒重 20.0 克。生育期 98.8 天，比对照南农 66 晚 1.7 天。经病害鉴定，中抗大豆花叶病毒病 3 号株系，抗 7 号株系。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。5 月下旬至 6 月上中旬播种，根据肥力亩保苗 1.3-1.5 万株。2.施足底肥，合理追肥。底肥亩施复合肥 15-25 公斤，花荚期视苗情亩施尿素 5-8 公斤或增施叶面肥。3.加强田间管理。注意清沟排渍，及时中耕除草；花期视苗情适时化控，防止倒伏；结荚鼓粒期遇干旱及时灌溉。4.病虫害防治：注意防治紫斑病、根腐病和地老虎、蚜虫、斜纹夜蛾等病虫害。5.适时收获。

适宜范围：适于湖北省作夏大豆种植。

10. 华研 9 号（区试代号：华研 9 号）

申请者：湖北楚强丰农业科技有限公司、山东华研种业科技有限公司

育种者：湖北楚强丰农业科技有限公司、山东华研种业科技有限公司

品种来源：华豆 36/中黄 301

品质产量：2024-2025 年参加湖北省夏大豆品种区域试验，两年区试平均亩产 207.01 公斤，比对照南农 66 增产 9.48%。其中：2024 年平均亩产 216.50 公斤，比对照南农 66 增产 10.99%；2025 年平均亩产 197.51 公斤，比对照南农 66 增产 7.97%。2025 年生产试验平均亩产 196.8 公斤，比对照南农 66 增产 12.52%。品质经农业农村部谷物品质检验检测中心测定，含油量 20.57%，粗蛋白含量 46.59%。

特征特性：属高蛋白夏大豆品种。株型收敛，株高适中，茎秆直立，有限结荚习性。叶椭圆形，花白色，茸毛棕色。成熟荚浅褐色。籽粒圆形，种皮黄色、子叶黄色，种脐淡褐色。区域试验中株高 48.9 厘米，主茎节数 12.0 个，分枝数 2.3 个，单株荚数 44.7 个，单株粒数 102.4 个，单株粒重 15.4 克，完全粒率 87.0%，百粒重 16.4 克。生育期 94.2 天，比对照南农 66 早 2.2 天。经病害鉴定，中抗大豆花叶病毒病 3 号株系和 7 号株系。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。5 月下旬至 6 月上中旬播种，根据肥力亩保

苗 1.3-1.5 万株。2.施足底肥，合理追肥。底肥亩施复合肥 15-25 公斤，花荚期视苗情亩施尿素 5-8 公斤或增施叶面肥。3.加强田间管理。注意清沟排渍，及时中耕除草；花期视苗情适时化控，防止倒伏；结荚鼓粒期遇干旱及时灌溉。4.病虫害防治：注意防治紫斑病、根腐病和地老虎、蚜虫、斜纹夜蛾等病虫害。5.适时收获。

适宜范围：适于湖北省作夏大豆种植。

11.嘉科 3 号（区试代号：嘉科 3 号）

申请者：天门市三江种业、济宁梁育种业科技有限公司

育种者：天门市三江种业、济宁梁育种业科技有限公司

品种来源：荷豆 12/华豆 36

品质产量：2024-2025 年参加湖北省夏大豆品种区域试验，两年区试平均亩产 210.94 公斤，比对照南农 66 增产 11.53%。其中：2024 年平均亩产 222.48 公斤，比对照南农 66 增产 14.05%；2025 年平均亩产 199.39 公斤，比对照南农 66 增产 9.00%。2025 年生产试验平均亩产 197.2 公斤，比对照南农 66 增产 12.75%。品质经农业农村部谷物品质检验测试中心测定，含油量 19.49%，粗蛋白含量 43.46%。

特征特性：属夏大豆品种。株型收敛，株高适中，茎秆直立，有限结荚习性。叶椭圆形，花白色，茸毛棕色。成熟荚浅褐色。籽粒圆形，种皮黄色、子叶黄色，种脐淡褐色。区域试验中株高 49.9 厘米，主茎节数 11.7 个，分枝数 2.0 个，单株荚数 40.2 个，单株粒数 89.7 个，单株粒重 17.7 克，完全粒率 94.3%，百粒重 20.7 克。生育期 95.4 天，比对照南农 66 早 1.0 天。经病害鉴定，中抗大豆花叶病毒病 3 号株系和 7 号株系。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。5 月下旬至 6 月上中旬播种，根据肥力亩保苗 1.3-1.5 万株。2.施足底肥，合理追肥。底肥亩施复合肥 15-25 公斤，花荚期视苗情亩施尿素 5-8 公斤或增施叶面肥。3.加强田间管理。注意清沟排渍，及时中耕除草；花期视苗情适时化控，防止倒伏；结荚鼓粒期遇干旱及时灌溉。4.病虫害防治：注意防治紫斑病、根腐病和地老虎、蚜虫、斜纹夜蛾等病虫害。5.适时收获。

适宜范围：适于湖北省作夏大豆种植。

12.道秋 56（区试代号：道秋 56）

申请者：天门国豪种业经营部、山东秋收种业有限公司

育种者：山东秋收种业有限公司

品种来源：皖豆 37/豫豆 22

品质产量：2024-2025 年参加湖北省夏大豆品种区域试验，两年区试平均亩产 214.70 公斤，比对照南农 66 增产 13.70%。其中：2024 年平均亩产 215.77 公斤，比对照南农 66 增产 10.62%；2025 年平均亩产 213.62 公斤，比对照南农 66 增产 16.78%。

2025 年生产试验平均亩产 205.0 公斤，比对照南农 66 增产 17.21%。品质经农业农村部谷物品质检验测试中心测定，含油量 20.96%，粗蛋白含量 47.40%。

特征特性：属高蛋白夏大豆品种。株型收敛，株高适中，茎秆直立，有限结荚习性。叶椭圆形，花紫色，茸毛灰色。成熟荚中等褐色。籽粒圆形，种皮黄色、子叶黄色，种脐淡黄色。区域试验中株高 58.8 厘米，主茎节数 12.2 个，分枝数 2.2 个，单株荚数 40.4 个，单株粒数 89.5 个，单株粒重 16.7 克，完全粒率 90.2%，百粒重 19.3 克。生育期 100.9 天，比对照南农 66 晚 4.5 天。经病害鉴定，中感大豆花叶病毒病 3 号株系和 7 号株系。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。5 月下旬至 6 月上中旬播种，根据肥力亩保苗 1.3-1.5 万株。2.施足底肥，合理追肥。底肥亩施复合肥 15-25 公斤，花荚期视苗情亩施尿素 5-8 公斤或增施叶面肥。3.加强田间管理。注意清沟排渍，及时中耕除草；花期视苗情适时化控，防止倒伏；结荚鼓粒期遇干旱及时灌溉。4.病虫害防治：注意防治紫斑病、根腐病和地老虎、蚜虫、斜纹夜蛾等病虫害。5.适时收获。

适宜范围：适于湖北省作夏大豆种植。

13.俊豆 17（区试代号：俊豆 17）

申请者：武汉弘耕种业有限公司、嘉祥县俊豪种业有限公司

育种者：嘉祥县俊豪种业有限公司

品种来源：齐黄 34/徐豆 10 号

品质产量：2024-2025 年参加湖北省夏大豆品种区域试验，两年区试平均亩产 209.57 公斤，比对照南农 66 增产 10.93%。其中：2024 年平均亩产 214.01 公斤，比对照南农 66 增产 9.71%；2025 年平均亩产 205.13 公斤，比对照南农 66 增产 12.14%。2025 年生产试验平均亩产 192.0 公斤，比对照南农 66 增产 9.78%。品质经农业农村部谷物品质检验测试中心测定，含油量 21.11%，粗蛋白含量 45.67%。

特征特性：属高蛋白夏大豆品种。株型收敛，株高适中，茎秆直立，有限结荚习性。叶椭圆形，花白色，茸毛棕色。成熟荚浅褐色。籽粒圆形，种皮黄色、子叶黄色，种脐黄色。区域试验中株高 55.4 厘米，主茎节数 11.4 个，分枝数 1.9 个，单株荚数 40.8 个，单株粒数 85.2 个，单株粒重 17.2 克，完全粒率 87.6%，百粒重 21.1 克。生育期 97.0 天，比南农 66 晚 0.6 天。经病害鉴定，中抗大豆花叶病毒病 3 号株系，中感 7 号株系。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。5 月下旬至 6 月上中旬播种，根据肥力一般亩保苗 1.33 万株。2.施足底肥，合理追肥。底肥亩施复合肥 30-40 公斤，花荚期视苗情亩施尿素 5 公斤或增施叶面肥。3.加强田间管理。注意清沟排渍，及时中耕除草；结荚鼓粒期遇干旱及时灌溉。4.病虫害防治。注意防治根腐病和地老虎、蚜虫、斜纹

夜蛾等病虫害。5.适时收获。

适宜范围：适于湖北省作夏大豆种植。

14.智豆 15（原区试代号：智豆 15）

申请者：湖北才智种业科技有限公司

育种者：湖北才智种业科技有限公司

品种来源：徐豆 16/天隆一号

品质产量：2024-2025 年参加湖北省夏大豆品种区域试验，两年区试平均亩产 216.49 公斤，比对照南农 66 增产 11.14%。其中：2024 年平均亩产 216.93 公斤，比对照南农 66 增产 4.18%；2025 年平均亩产 216.04 公斤，比对照南农 66 增产 18.10%。2025 年生产试验平均亩产 203.5 公斤，比对照南农 66 增产 16.35%。品质经农业农村部谷物品质检验测试中心测定，含油量 21.97%，粗蛋白含量 44.08%。

特征特性：属高油夏大豆品种。株型收敛，株高适中，茎秆直立，有限结荚习性。叶椭圆形，花紫色，茸毛灰色。成熟荚浅褐色。籽粒圆形，种皮黄色、子叶黄色，种脐浅褐色。区域试验中株高 54.9 厘米，主茎节数 11.6 个，分枝数 3.1 个，单株荚数 41.0 个，单株粒数 82.2 个，单株粒重 15.7 克，完全粒率 93.7%，百粒重 20.0 克。生育期 98.5 天，比对照南农 66 晚 1.4 天。经病害鉴定，高抗大豆花叶病毒病 3 号株系和 7 号株系。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。5 月中下旬播种，根据肥力一般亩保苗 1.33 万株。2.施足底肥，合理追肥。底肥一般亩施复合肥 25 公斤，花荚期视苗情亩施尿素 5-10 公斤或增施叶面肥。3.加强田间管理。注意清沟排渍，及时中耕除草；花期视苗情适时化控，防止倒伏；结荚鼓粒期遇干旱及时灌溉。4.病虫害防治：注意防治紫斑病、根腐病和地老虎、蚜虫、斜纹夜蛾等病虫害。5.适时收获。

适宜范围：适于湖北省作夏大豆种植。

15.鸣豆一号（区试代号：鸣豆一号）

申请者：湖北鸣吉农业科技有限公司

育种者：湖北鸣吉农业科技有限公司

品种来源：中黄 13/99-4

品质产量：2023-2024 年参加湖北省夏大豆品种区域试验，两年区试平均亩产 193.69 公斤，比对照中豆 41 减产 0.38%。其中：2023 年平均亩产 190.54 公斤，比对照中豆 41 减产 0.47%；2024 年平均亩产 196.83 公斤，比对照中豆 41 减产 0.30%。2025 年生产试验平均亩产 208.8 公斤，比对照中豆 41 增产 16.32%。品质经农业农村部谷物品质检验测试中心测定，含油量 19.75%，粗蛋白含量 45.43%。

特征特性：属高蛋白夏大豆品种。株型收敛，株高适中，茎秆直立，有限结荚习

性。叶椭圆形，花白色，茸毛灰色。成熟荚浅褐色。籽粒椭圆形，种皮浅黄色、子叶黄色，种脐浅褐色。区域试验中株高 54.6 厘米，主茎节数 13.8 个，分枝数 3.1 个，单株荚数 58.6 个，单株粒数 114.3 个，单株粒重 18.6 克，完全粒率 92.0%，百粒重 17.6 克。生育期 98.9 天，比对照中豆 41 晚 0.3 天。经病害鉴定，中抗大豆花叶病毒病 3 号株系和 7 号株系。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。5 月下旬至 6 月上旬播种，根据肥力亩保苗 1.3-1.5 万株。2.施足底肥，合理追肥。底肥亩施复合肥 15-20 公斤，花荚期视苗情亩施尿素 3-5 公斤或增施叶面肥。3.加强田间管理。注意清沟排渍，及时中耕除草；花期视苗情适时化控，防止倒伏；结荚鼓粒期遇干旱及时灌溉。4.病虫害防治：注意防治紫斑病、根腐病和卷叶蛾、斜纹夜蛾、豆荚螟、烟粉虱、点蜂缘蝽及地下害虫等。5.适时收获。

适宜范围：适于湖北省作夏大豆种植。

16.沃金豆 815（区试代号：沃豆 1815）

申请者：湖北沃豆农业发展有限公司

育种者：湖北沃豆农业发展有限公司

品种来源：冀豆 12/浙鲜豆 5 号

品质产量：2023-2024 年参加湖北省早播夏大豆品种区域试验，两年区试平均亩产 199.98 公斤，比对照鄂豆 8 号增产 8.72%。其中：2023 年平均亩产 190.49 公斤，比对照鄂豆 8 号增产 10.97%；2024 年平均亩产 209.46 公斤，比对照鄂豆 8 号增产 6.75%。2024 年生产试验平均亩产 195.1 公斤，比对照鄂豆 8 号增产 16.5%。品质经农业农村部谷物品质检验检测中心测定，含油量 18.87%，粗蛋白含量 46.77%。

特征特性：属高蛋白早播夏大豆品种。株型收敛，株高适中，茎秆直立，有限结荚习性。叶椭圆形，花白色，茸毛灰色。成熟荚黄褐色。籽粒椭圆形，种皮黄色、子叶黄色，种脐淡褐色。区域试验中株高 59.1 厘米，主茎节数 11.4 个，分枝数 2.6 个，单株荚数 29.4 个，单株粒数 62.7 个，单株粒重 11.4 克，完全粒率 89.8%，百粒重 19.0 克。生育期 82.8 天，比对照鄂豆 8 号晚 1.1 天。经病害鉴定，中感大豆花叶病毒病 3 号和 7 号株系。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。一般 5 月上中旬播种，根据肥力一般亩保苗 2.4 万株。2.施足底肥，合理追肥。底肥一般亩施复合肥 30 公斤，花荚期视苗情亩施尿素 5-10 公斤或增施叶面肥。3.加强田间管理。注意清沟排渍，及时中耕除草；花期视苗情适时化控，防止倒伏；结荚鼓粒期遇干旱及时灌溉。4.病虫害防治：注意防治紫斑病、根腐病和地老虎、蚜虫、斜纹夜蛾等病虫害。5.适时收获。

适宜范围：适于湖北省作早播夏大豆种植。

17.中豆 128（区试代号：油春 J8060）

申请者：中国农业科学院油料作物研究所

育种者：中国农业科学院油料作物研究所

品种来源：天隆一号/蜀鲜 205

品质产量：2024-2025 年参加湖北省早播夏大豆联合体品种区域试验，两年区试平均亩产 207.84 公斤，比对照鄂豆 8 号增产 19.15%。其中：2024 年平均亩产 227.53 公斤，比对照鄂豆 8 号增产 15.96%；2025 年平均亩产 188.15 公斤，比对照鄂豆 8 号增产 23.27%。2025 年生产试验平均亩产 194.5 公斤，比对照鄂豆 8 号增产 19.30%。品质经农业农村部谷物品质检验测试中心测定，含油量 19.01%，粗蛋白含量 46.32%。

特征特性：属高蛋白早播夏大豆品种。株型收敛，株高适中，茎秆直立，有限结荚习性。叶卵圆形，花白色，茸毛灰色。成熟荚灰褐色。籽粒椭圆形，种皮黄色、子叶黄色，种脐黄色。区域试验中株高 64.1 厘米，主茎节数 11.6 个，分枝数 2.8 个，单株荚数 31.8 个，单株粒数 64.7 个，单株粒重 11.0 克，完全粒率 88.6%，百粒重 20.2 克。生育期 87.3 天，比对照鄂豆 8 号晚 5.7 天。经病害鉴定，中抗大豆花叶病毒病 3 号株系和 7 号株系。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。5 月上中旬左右播种，根据肥力一般亩保苗 2.4 万株。2.施足底肥，合理追肥。底肥一般亩施复合肥 30 公斤，花荚期视苗情亩施尿素 5-10 公斤或增施叶面肥。3.加强田间管理。注意清沟排渍，及时中耕除草；花期视苗情适时化控，防止倒伏；结荚鼓粒期遇干旱及时灌溉。4.病虫害防治：注意防治根腐病和地老虎、蚜虫、斜纹夜蛾等病虫害。5.适时收获。

适宜范围：适于湖北省作早播夏大豆种植。

18.恒豆 7 号（区试代号：荆早 1 号）

申请者：荆门（中国农谷）农业科学研究院、嘉祥县恒裕种业有限公司

育种者：荆门（中国农谷）农业科学研究院、嘉祥县恒裕种业有限公司

品种来源：鄂豆 10 号/中黄 13

品质产量：2024-2025 年参加湖北省早播夏大豆联合体品种区域试验，两年区试平均亩产 188.41 公斤，比对照鄂豆 8 号增产 8.01%。其中：2024 年平均亩产 210.63 公斤，比对照鄂豆 8 号增产 7.35%；2025 年平均亩产 166.18 公斤，比对照鄂豆 8 号增产 8.88%。2025 年生产试验平均亩产 175.5 公斤，比对照鄂豆 8 号增产 7.70%。品质经农业农村部谷物品质检验测试中心测定，含油量 16.80%，粗蛋白含量 49.48%。

特征特性：属高蛋白早播夏大豆品种。株型收敛，株高适中，茎秆直立，有限结荚习性。叶卵圆形，花白色，茸毛灰色。成熟荚黄褐色。籽粒椭圆形，种皮黄色、子叶黄色，种脐褐色。区域试验中株高 64.6 厘米，主茎节数 10.7 个，分枝数 1.0 个，单

株荚数 25.0 个，单株粒数 51.7 个，单株粒重 9.6 克，完全粒率 90.0%，百粒重 21.1 克。生育期 85.5 天，比对照鄂豆 8 号晚 3.9 天。经病害鉴定，中感大豆花叶病毒病 3 号株系，感病 7 号株系。

栽培要点：1.适时播种，合理密植。5 月上旬左右播种，根据肥力亩保苗 1.67-2.08 万株。2.施足底肥，合理追肥。底肥一般亩施复合肥 30 公斤，花荚期视苗情亩施尿素 5 公斤左右或增施叶面肥。3.加强田间管理。注意清沟排渍，及时中耕除草；花期视苗情适时化控，防止倒伏；结荚鼓粒期遇干旱及时灌溉。4.病虫害防治：注意防治根腐病和地老虎、蚜虫、斜纹夜蛾等病虫害。5.适时收获。

适宜范围：适于湖北省作早播夏大豆种植。

棉花

1.荆棉 97（区试代号：荆棉 97）

申请者：荆州农业科学院、中国农业科学院棉花研究所

育种者：荆州农业科学院、中国农业科学院棉花研究所

品种来源：03-19/鄂杂棉 24F₁

品质产量：2023-2024 年参加湖北省棉花品种区域试验，纤维品质经农业农村部棉花品质监督检验测试中心测试：纤维上半部平均长度 30.7 毫米，断裂比强度 31.2 厘牛/特克斯，马克隆值 4.8。两年区域试验平均皮棉亩产 100.50 公斤，比对照鄂抗棉 13 增产 6.84%。其中：2023 年皮棉亩产 113.33 公斤，比鄂抗棉 13 增产 6.64%；2024 年皮棉亩产 87.67 公斤，比鄂抗棉 13 增产 7.08%。2024 年生产试验皮棉亩产 98.32 公斤，比鄂抗棉 13 增产 10.31%。

特征特性：属转 Bt 基因常规抗虫棉品种。植株塔型，茎秆有稀茸毛，前中期生长势较强，后期一般，整齐度一般。叶片中等偏大，叶色深绿，苞叶较大。铃卵圆形、中等大小，铃尖突起中等，吐絮畅。区域试验中株高 129.0 厘米，果枝数 18.9 个，单株成铃数 30.8 个，单铃重 5.48 克，大样衣分 39.99%，子指 10.8 克。生育期 118.8 天。霜前花率 98.3%。抗病虫性鉴定为耐枯萎病、耐黄萎病，抗棉铃虫。

栽培要点：1.适时播种。4 月上中旬播种，营养钵育苗移栽，亩栽密度 1800-2000 株。2.科学施肥。底肥亩施复合肥（N:P:K=15:15:15）30 公斤，硼肥 1 公斤；蕾期施 5 公斤尿素；见花施花铃肥，亩施尿素 20-25 公斤，氯化钾 15 公斤。3.合理化控。根据棉花长势、施肥、墒情等合理化调，遵循“少量多次、前轻中适后重”的原则。4.加强田间管理。适时中耕，起垄培土；及时整枝、打顶、抹赘芽；遇高温干旱及时灌水抗旱；全生育期搞好病虫害的综合防治。

适宜范围：适于湖北省棉区种植，枯萎病、黄萎病重病地不宜种植。

2. 华棉 2802（区试代号：华棉 2802）

申请者：华中农业大学

育种者：华中农业大学

品种来源：泗棉 3 号/11910

品质产量：2022-2023 年参加湖北省棉花品种区域试验，纤维品质经农业农村部棉花品质监督检验测试中心测试：纤维上半部平均长度 29.9 毫米，断裂比强度 30.7 厘牛/特克斯，马克隆值 4.2。两年区域试验平均皮棉亩产 107.52 公斤，比对照鄂抗棉 13 号增产 9.47%。其中：2022 年皮棉亩产 92.27 公斤，比鄂抗棉 13 增产 1.99%；2023 年皮棉亩产 122.77 公斤，比鄂抗棉 13 增产 15.85%。2024 年生产试验皮棉亩产 102.27 公斤，比鄂抗棉 13 号增产 14.74%。

特征特性：属转 Bt 基因常规抗虫棉品种。植株塔型，通透性较好，茎秆有稀茸毛，生长中等，整齐度较好。叶片中等偏小，叶色绿色，苞叶中等大小。铃圆形、中等大小，铃尖突起较弱，吐絮畅。区域试验中株高 136.2 厘米，果枝数 18.2 个，单株成铃数 31.5 个，单铃重 5.73 克，大样衣分 38.87%，子指 11.5 克。生育期 117.2 天。抗病虫性鉴定为抗枯萎病、耐黄萎病，抗棉铃虫。

栽培要点：1. 适时播种。4 月上中旬播种，营养钵育苗移栽，亩栽密度 1800-2000 株。2. 科学施肥。底肥亩施复合肥（N:P:K=15:15:15）30 公斤，硼肥 1 公斤；蕾期施 5 公斤尿素；见花施花铃肥，亩施尿素 20-25 公斤，氯化钾 15 公斤。3. 合理化控。根据棉花长势、施肥、墒情等合理化调，遵循“少量多次、前轻中适后重”的原则。4. 加强田间管理。适时中耕，起垄培土；及时整枝、打顶、抹赘芽；遇高温干旱及时灌水抗旱；全生育期搞好病虫害的综合防治。

适宜范围：适于湖北省棉区种植，黄萎病重病地不宜种植。

3. 冈杂棉 12 号（区试代号：冈杂棉 12 号）

申请者：黄冈市农业科学院

育种者：黄冈市农业科学院

品种来源：GJ1503×GM21-1

品质产量：2023-2024 年参加湖北省棉花品种区域试验，纤维品质经农业农村部棉花品质监督检验测试中心测试：纤维上半部平均长度 30.8 毫米，断裂比强度 32.6 厘牛/特克斯，马克隆值 4.9。两年区域试验平均皮棉亩产 110.45 公斤，比对照鄂杂棉 10 号增产 1.99%。其中：2023 年皮棉亩产 124.93 公斤，比鄂杂棉 10 号增产 1.13%；2024 年皮棉亩产 95.97 公斤，比鄂杂棉 10 号增产 3.12%。2025 年生产试验皮棉亩产 105.30 公斤，比鄂杂棉 10 号增产 7.61%。

特征特性：属转 Bt 基因杂交抗虫棉品种。植株塔型，茎秆粗壮有茸毛，较高大，生长势强，整齐度较好。叶片较大，叶色深绿，苞叶中等大小。铃卵圆形、较大，铃尖突起中等，吐絮畅。区域试验中株高 132.9 厘米，果枝数 18.4 个，单株成铃数 32.4 个，单铃重 5.92 克，大样衣分 39.52%，子指 12.1 克。生育期 118.9 天。抗病虫性鉴定为耐枯萎病、耐黄萎病，抗棉铃虫。

栽培要点：1.适时播种。4 月上中旬播种，营养钵育苗移栽，亩栽密度 1800-2000 株。2.科学施肥。底肥亩施复合肥（N:P:K=15:15:15）30 公斤，硼肥 1 公斤；蕾期施 5 公斤尿素；见花施花铃肥，亩施尿素 20-25 公斤，氯化钾 15 公斤。3.合理化控。根据棉花长势、施肥、墒情等合理化调，遵循“少量多次、前轻中适后重”的原则。4.加强田间管理。适时中耕，起垄培土；及时整枝、打顶、抹赘芽；遇高温干旱及时灌水抗旱；全生育期搞好病虫害的综合防治。

适宜范围：适于湖北省棉区种植，枯萎病、黄萎病重病地不宜种植。

4.华棉 2485（区试代号：华棉 2485）

申请者：华中农业大学

育种者：华中农业大学

品种来源：07-7M/E25496

品质产量：2022-2023 年参加湖北省棉花品种区域试验，纤维品质经农业农村部棉花品质监督检验测试中心测试：纤维上半部平均长度 30.1 毫米，断裂比强度 30.0 厘牛/特克斯，马克隆值 4.7。两年区域试验平均皮棉亩产 84.90 公斤，比对照晶华棉 116 增产 1.12%。其中：2022 年皮棉亩产 81.43 公斤，比晶华棉 116 增产 0.74%；2023 年皮棉亩产 88.37 公斤，比晶华棉 116 增产 1.48%。2024 年生产试验皮棉亩产 88.53 公斤，比晶华棉 116 增产 5.19%。

特征特性：属转 Bt 基因常规抗虫棉品种。植株塔型，茎秆有稀茸毛，生长势较强，整齐度较好。叶片中等偏大，叶色深绿，苞叶中等大小。铃卵圆形、中等大小，铃尖突起中等，吐絮畅。区域试验中株高 115.3 厘米，果枝数 14.3 个，单株成铃数 14.6 个，单铃重 5.28 克，大样衣分 38.72%，子指 10.8 克。生育期 98.9 天。抗病虫性鉴定为抗枯萎病、耐黄萎病，抗棉铃虫。

栽培要点：1.适时播种。5 月下旬至 6 月上旬播种，每亩直播密度 3500-4500 株，每穴播 2-3 粒，出苗后及时间苗补苗。2.科学施肥。不施底肥，轻施早施一次提苗肥，见花后施入其余全部肥料，一般亩施纯氮 11-15 公斤，氮磷钾比例为 1:0.5:1。3.合理化控。遵循前轻后重、少量多次的原则。4.加强田间管理。适时中耕，起垄培土，及时整枝、打顶、抹赘芽，遇旱及时灌溉。5.加强虫害防治。重点防治红蜘蛛、盲蝽蟊，注意防治棉蚜、三四代棉铃虫、红铃虫、斜纹夜蛾和烟粉虱等害虫。

适宜范围：适于湖北省棉区油菜或小麦收获后种植，黄萎病重病地不宜种植。

5.鄂棉 QS06（区试代号：鄂棉 QS06）

申请者：湖北省农业科学院经济作物研究所

育种者：湖北省农业科学院经济作物研究所、湖北洪山实验室

品种来源：TM02/KC9704

品质产量：2023-2024 年参加湖北省棉花品种区域试验，纤维品质经农业农村部棉花品质监督检验测试中心测试：纤维上半部平均长度 29.8 毫米，断裂比强度 30.1 厘牛/特克斯，马克隆值 4.9。两年区域试验平均皮棉亩产 98.44 公斤，比对照晶华棉 116 增产 8.16%。其中：2023 年皮棉亩产 96.20 公斤，比晶华棉 116 增产 10.47%；2024 年皮棉亩产 100.67 公斤，比晶华棉 116 增产 6.04%。2024 年生产试验皮棉亩产 88.47 公斤，比晶华棉 116 增产 5.19%。

特征特性：属转 Bt 基因常规抗虫棉品种。植株塔型，茎秆有茸毛，生长势较强，整齐度较好。叶片较大，叶色深绿，苞叶中等大小。铃卵圆形、中等偏小，铃尖突起中等，吐絮畅。区域试验中株高 100.3 厘米，果枝数 13.5 个，单株成铃数 15.9 个，单铃重 4.84 克，大样衣分 42.10%，子指 11.3 克。生育期 99.7 天。抗病虫性鉴定为耐枯萎病、耐黄萎病，抗棉铃虫。

栽培要点：1.适时播种。5 月下旬至 6 月上旬播种，每亩直播密度 3500-4500 株，每穴播 2-3 粒，出苗后及时间苗补苗。2.科学施肥。不施底肥，轻施早施一次提苗肥，见花后施入其余全部肥料，亩施纯氮 11-15 公斤，氮磷钾比例为 1:0.5:1。3.合理化控。遵循前轻后重、少量多次的原则。4.加强田间管理。适时中耕，起垄培土，及时整枝、打顶、抹赘芽，遇旱及时灌溉。5.加强虫害防治。重点防治红蜘蛛、盲蝽蟊，注意防治棉蚜、三四代棉铃虫、红铃虫、斜纹夜蛾和烟粉虱等害虫。

适宜范围：适于湖北省棉区油菜或小麦收获后种植，枯萎病、黄萎病重病地不宜种植。

6.鄂棉 36（区试代号：鄂棉 36）

申请者：湖北省农业科学院经济作物研究所

育种者：湖北省农业科学院经济作物研究所、湖北洪山实验室

品种来源：鄂棉 23/H48

品质产量：2023-2024 年参加湖北省棉花品种区域试验，纤维品质经农业农村部棉花品质监督检验测试中心测试：纤维上半部平均长度 36.0 毫米，断裂比强度 33.4 厘牛/特克斯，马克隆值 3.8。两年区域试验平均皮棉亩产 87.32 公斤，比对照晶华棉 116 减产 1.48%。其中：2023 年皮棉亩产 87.37 公斤，比晶华棉 116 减产 0.64%；2024 年皮棉亩产 87.27 公斤，比晶华棉 116 减产 2.31%。2024 年生产试验皮棉亩产 84.57

公斤，比晶华棉 116 增产 0.49%。

特征特性：属非转基因常规棉品种。植株塔型，茎秆有稀茸毛，生长势较强，整齐度较好。叶片中等，叶色绿色，苞叶中等大小。铃卵圆形、中等偏大，铃尖突起较强，吐絮畅。区域试验中株高 106.1 厘米，果枝数 12.8 个，单株成铃数 13.9 个，单铃重 5.60 克，大样衣分 38.44%，子指 12.4 克。生育期 101.7 天。抗病虫性鉴定为抗枯萎病、耐黄萎病，不抗棉铃虫。

栽培要点：1.适时播种。5 月下旬至 6 月上旬播种，每亩直播密度 3500-4500 株，每穴播 2-3 粒，出苗后及时间苗补苗。2.科学施肥。不施底肥，轻施早施一次提苗肥，见花后施入其余全部肥料，亩施纯氮 11-15 公斤，氮磷钾比例为 1:0.5:1。3.合理化控。遵循前轻后重、少量多次的原则。4.加强田间管理。适时中耕，起垄培土，及时整枝、打顶、抹赘芽，遇旱及时灌溉。5.加强虫害防治。重点防治红蜘蛛、盲蝽蟊，注意防治棉铃虫、红铃虫、棉蚜、斜纹夜蛾和烟粉虱等害虫。

适宜范围：适于湖北省棉区油菜或小麦收获后种植，黄萎病重病地不宜种植。

