

农业与气象服务快报

2026 年 第 16 期

湖北省气候中心

湖北省农业技术推广总站

2026 年 8 月 10 日

上周西部多分散性强降雨，东部晴热高温 本周受台风影响高温缓解，需防范强降水和大风的不利影响

一、上周作物生长发育状况

上周（2026 年 8 月 3—9 日，下同）我省再生稻为灌浆期，中稻为孕穗至抽穗期，春玉米为成熟期，夏玉米为大喇叭口期至抽雄期，棉花为现蕾开花期，双季晚稻为分蘖期。

二、上周农业气象条件分析

上周我省持续晴热高温天气，午后西部多阵雨或雷阵雨。其中 3—4 日恩施州大部、十堰中西部、宜昌西部、保康大到暴雨，十堰、利川、秭归、长阳大暴雨，伴有 8 到 9 级雷暴大风；5—9 日全省晴到多云，十堰、襄阳、宜昌、黄冈、仙桃、恩施单点出现“坨子雨”和 8 到 9 级雷暴大风。周累计雨量宜昌、恩施州大部、襄阳保康和枣阳、十堰中部、神农架、仙桃和麻城 50 毫米以上，秭归单点降雨量达 316.1 毫米；武汉、孝感东部、鄂州、黄石、黄冈中南部、咸宁东部及潜江至荆州一带降水不足 10 毫米；其他地区降水 10~50 毫米（图 1）。

日最高气温 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 高温日数西部大部 0~1 天，东部 3~6 天（图 2），极端最高气温黄冈大部、武汉、鄂州、咸宁、黄石大部及孝感大部 37.0°C 及以上，其中黄冈中北部、鄂州、武汉西部至汉川一带和咸宁西部 $38.0\sim 38.8^{\circ}\text{C}$ （图 3）。

上周西部地区降雨极端性强，部分低洼农田出现渍涝，影响春玉米收获晾晒。东部地区晴热高温天气对夏玉米抽雄吐丝、中稻孕穗抽穗较为不利，鄂北岗地旱情有所发展（图 4）。




图 1 湖北省 2026 年 8 月 3—9 日累计降水量（毫米）




图 2 湖北省 2026 年 8 月 3—9 日日最高气温 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 日数 (天)




图 3 湖北省 2026 年 8 月 3—9 日极端最高气温 ($^{\circ}\text{C}$)




图 4 湖北省 2026 年 8 月 2 日（左）、8 月 9 日（右）

20cm 土壤相对湿度监测对比（%）

三、本周天气趋势及农业生产建议

预计本周（8 月 10—16 日）前期受台风“白海豚”环流影响，10 日鄂东北和 11 日鄂西有大雨到暴雨，局地大暴雨，伴有 6 到 9 级，局地 10 级阵风；12—13 日雨势减弱，此后转为多云天气，有分散性阵雨或雷阵雨。受台风影响，15 日前全省无 35℃ 以上高温天气。具体预报如下：

8 月 10 日，鄂东北、襄阳、荆门阵雨转大雨到暴雨、局地大暴雨；鄂东南、荆州、天门、潜江、仙桃阵雨转中到大雨、局地暴雨；其他地区多云，有分散性阵雨或雷阵雨。最高气温中西部 32～36℃、东部 27～31℃，最低气温西部 22～26℃，偏北风 4 到 5 级、阵风 6 到 9 级、局地 10 级。

8 月 11 日，鄂西北阴天有大雨到暴雨，局地大暴雨，单点特大暴雨；宜昌、荆门、随州阴天有大雨到暴雨；其他地区阴天有小到中雨、局地大雨。最高气温 26～31℃，最低气温 22～26℃，偏北风 3 到 4 级、阵风 6 到 8 级、局地 9 级。

8 月 12 日全省阴天有小到中雨，荆门、襄阳、宜昌局地大雨，单点暴雨。最高气温西部 27～30℃、东部 30～33℃，

最低气温 22 ~ 27℃。

本周全省无明显高温热害，降雨也有利于缓解干旱、增蓄雨水，对农业生产总体有利。但襄阳、随州、宜昌北部、荆门西部、十堰东部累计雨量大，低洼农田渍涝风险较高；同时，伴随的大风可能造成玉米等高杆作物倒伏，台风过后可能出现“两迁”害虫集中爆发风险。农业生产建议如下：

一是适时组织收获。再生稻头季谷粒黄熟度达到 85% 的田块，抢抓雨停间隙，集中收割机械进行抢收，收割机走“回”字形路线进行收割，尽量减少稻桩碾压，视收获时间调整留桩高度。同时提前开启烘干设备，确保收获的稻谷能够及收及烘及储。已经成熟的春玉米田块排干渍水后，及时机械收割，因降雨倒伏的田块，收割机沿倒伏方向的逆向或侧向进行收割，适时降低收割速度，减少收割损失。春玉米籽粒含水率在 25% 以上的品种，采取机械摘穗收获方式；籽粒含水率在 25% 以下的品种，采用籽粒直收方式，收获后及时晾晒或烘干。

二是强化分类施策。在田中稻、双季晚稻降雨前提前降低田间水位预留蓄水容量，同时及时清理和加固“三沟”，确保雨后田间多余积水及时排出；已经齐穗的中稻因田因苗开展“一喷多促”，促进保粒增重；夏玉米、夏大豆雨后及时中耕排水散墒，避免积水沤根。夏玉米开花期间根据苗情可喷施“叶面肥 + 生长调节剂 + 杀菌剂”的混合溶液，提高植株抗性，改善开花授粉条件。棉花打顶后追施 5-7 公斤复合肥，促进及早结铃。

三是注意防治病虫。中稻、双季晚稻重点防治稻飞虱和稻纵卷叶螟，密切监测雨后田间虫害密度，及时查缺补漏，防治效果不好的田块务必用足药量开展二次防治，避免后期虫害爆发。夏玉米开花期间重点防治草地贪夜蛾和玉米螟虫，棉花重点防治烟粉虱、棉铃虫、斜纹夜蛾等。

制作：温泉沛、冯德豪、蔡鑫

审核、签发：刘凯文、曹鹏

报送单位：省农业农村厅，中国气象局减灾司、国家气象中心、国家气候中心，省局领导、减灾处、预报处、观测处

抄送：省局各直属单位，省植保总站

发送：各地市州气象局、农技推广（促进）中心